


УДК 612.161:519:218

**Б.Яворський, Л. Хвостівська, Є.Яворська**

(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

## **АТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИНФАЗНОГО ТА КОМПОНЕНТНОГО МЕТОДІВ ЩОДО АНАЛІЗУ ПУЛЬСОВОГО СИГНАЛУ СУДИН ЛЮДИНИ**


Для визначення параметрів судин і способів оцінки їх стану у сучасній кардіології застосовують сфігмографічний метод (неінвазивний метод) (Терехова Л.Г., Йонаш В., Власова С. П., Валтнерис А.Д., Савицький Н.И), який базується на аналізі форми пульсового сигналу (ПС) (рис.1).



**Рис.1. Реалізація ПС в стані норми**  
встановлено у праці Хвостівської Л. та Яворської Є., що така математична модель дає змогу адекватно описати сигнал, а саме врахувати у своїй структурі поєднання випадковості з повторністю сигналу (природа утворення ПС), а тому і розробити методи визначення нових в області кардіології інформативних ознак (параметрів) ПС виходячи із статистики таких сигналів для задач підвищення об'єктивності діагностики стану судин людини. Обґрутування методів статистичного оцінювання ПС базується на понятті  $\hbar$ -ергодичності, яка виражається як властивість випадкових процесів. Вирази, які виражают ПС як ПКВП через його компоненти (модельовані гармоніки кратних частот), показують що міра „випадковості” у ньому визначається випадковими властивостями цих компонент. Тому умову ергодичності ПС як ПКВП сформульовано як вимогу ергодичності векторного стаціонарного випадкового процесу його стаціонарних компонент, тобто стаціонарну і ергодичну пов'язаність компонент цього векторного процесу.  $\hbar$ -ергодичність обґрунтовує різні методи оцінювання характеристик ПС як ПКВП, зокрема синфазного та компонентного. Результати опрацювання ПС в стані норми зображені на рис. 2.

За формою та параметрами пульсового сигналу можна судити про зміни гемодинамічних характеристик, ритму серця, швидкості кровонаповнення в досліджуваній частині тіла.

З аналізу ПС та властивостей періодично корельованих випадкових процесів (ПКВП) можна судити про зміни гемодинамічних характеристик, ритму серця, швидкості кровонаповнення в досліджуваній частині тіла.



Синфазний метод

Компонентний метод

**Рис. 2 Кореляційні компоненти ПС в стані норми**

Отримані оцінки кореляційних компонент ПС (рис.2) синфазним та компонентним методами дають змогу підвищити об'єктивність діагностики стану судин людини шляхом впровадження в область кардіології нових (додаткових) інформативних ознак – кореляційних компонент.