

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ**

Кафедра вищої математики

**Практичні заняття  
із  
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ**

Частина 2: векторна алгебра

**ТЕРНОПІЛЬ  
2014 р.**

УДК 517.2  
ББК 22.161.6  
Г12

Укладач  
*Г. В. Габрусєв*

Рецензент  
*Лотоцький В. А.*,  
к.ф.-м.н., доц., зав. каф. математики  
і методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка

Затверджено на засіданні кафедри вищої математики.  
Протокол № 8 від «27» лютого 2014 р.

Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою  
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.  
Протокол № 6 від «13» березня 2014 р.

Г12 Г.В. Габрусєв. Практичні заняття із вищої математики (частина 2 :  
векторна алгебра) – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014.  
– 37 с.

© Габрусєв Г. В.  
© Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014

## **ЗМІСТ**

<b>Тема 1. Вектори і лінійні дії з ними. Проекція вектора на вісь. Базис. Системи координат. Вектори в системі координат. Поділ відрізка в даному відношенні .....</b>	<b>4</b>
<b>Тема 2. Скалярний добуток двох векторів, його властивості, механічний зміст, обчислення та застосування .....</b>	<b>10</b>
<b>Тема 3. Векторний та мішаний добуток векторів, їхні властивості, геометричний зміст, обчислення та застосування .....</b>	<b>14</b>
<b>Завдання розрахункової роботи.....</b>	<b>18</b>
<i>ВАРІАНТ 1.....</i>	<i>18</i>
<i>ВАРІАНТ 2.....</i>	<i>20</i>
<i>ВАРІАНТ 3.....</i>	<i>22</i>
<i>ВАРІАНТ 4.....</i>	<i>24</i>
<i>ВАРІАНТ 5.....</i>	<i>26</i>
<i>ВАРІАНТ 6.....</i>	<i>28</i>
<i>ВАРІАНТ 7.....</i>	<i>30</i>
<i>ВАРІАНТ 8.....</i>	<i>32</i>
<i>ВАРІАНТ 9.....</i>	<i>34</i>
<i>ВАРІАНТ 10.....</i>	<i>36</i>

# Тема 1. Вектори і лінійні дії з ними. Проекція вектора на вісь. Базис. Системи координат. Вектори в системі координат. Поділ відрізка в даному відношенні

---


**Задача 1.** Для яких ненульових векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  виконується умова  $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ?

**Розв'язання.** Якщо на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , віднесених до спільного початку, побудувати паралелограм, то вектор  $\vec{a} + \vec{b}$  напрямлений по діагоналі, яка виходить з цього спільного початку, і  $|\vec{a} + \vec{b}|$  дорівнює довжині цієї діагоналі, а вектор  $\vec{a} - \vec{b}$  напрямлений по другій діагоналі паралелограма і також  $|\vec{a} - \vec{b}|$  дорівнює довжині цієї другої діагоналі. Оскільки діагоналі прямокутника мають однакову довжину, то вектори  $\vec{a}$  та  $\vec{b}$  повинні бути перпендикулярними.

**Задача 2.** Для яких векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  вектор  $\vec{a} + \vec{b}$  ділить кут між цими векторами навпіл?

**Розв'язання.** Оскільки діагональ ромба ділить кут між сторонами ромба навпіл, то паралелограм, побудований на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , повинен перетворитися в ромб. А це буде тоді, коли  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ .

**Задача 3.** Нехай  $ABCD$  – паралелограм,  $M$  і  $N$  – середини його сторін (рис. 2.10). Розкласти вектор  $\overrightarrow{DC}$  за векторами  $\vec{a} = \overrightarrow{AM}$ ,  $\vec{b} = \overrightarrow{AN}$ .



**Розв'язання.** З трикутників  $AND$  і  $AMB$  маємо  $\vec{b} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ ,  
 $\vec{a} = \overrightarrow{DC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ .

Якщо з першої рівності знайти вектор  $\overrightarrow{AD}$  і підставити його значення в другу, дістанемо


$$\vec{a} = \overrightarrow{DC} + \frac{1}{2}\left(\vec{b} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}\right) = \frac{3}{4}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{2}\vec{b}, \quad \overrightarrow{DC} = \frac{4}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}.$$

Отже, якщо базисними векторами є вектори  $\vec{a} = \overrightarrow{AM}$  і  $\vec{b} = \overrightarrow{AN}$ , то координатами вектора  $\overrightarrow{DC}$  в цьому базисі є числа  $\frac{4}{3}$  і  $-\frac{2}{3}$ .

**Задача 4.**


- а). На координатній прямій  $Ox$  побудувати точки:  $A_1(3)$ ,  $A_2(-2)$ .
- б). У прямокутній системі координат  $Oxy$  побудувати точки  $B_1(1;2)$ ,  $B_2(2;-3)$ ,  $B_3(-3;0)$ .
- в). У прямокутній системі координат  $Oxyz$  побудувати точки  $C_1(1;2;3)$ ,  $C_2(3;-2;3)$ ,  $C_3(-1;-3;-5)$ .

Побудову точок показано на рис. 2.19, а – в.



**Задача 5.** Побудувати точки за полярними координатами:  $A\left(3; \frac{\pi}{4}\right)$ ,  $B\left(2; \frac{3}{2}\pi\right)$ ,  $C\left(4; \frac{5}{6}\pi\right)$ .

Дані точки показано на рис. 2.22.



**Задача 6.** В системі  $Oxy$  точка  $M$  має координати  $(2;4)$ . Знайти її координати в системі  $OXY$ , яка утворюється з системи  $Oxy$  поворотом на кут  $\frac{\pi}{2}$ .

**Розв'язання.** За формулами  $X = x \cos \alpha + y \sin \alpha$ ,  $Y = -x \sin \alpha + y \cos \alpha$  маємо

$$X = 2 \cos \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4, \quad Y = -2 \sin \frac{\pi}{2} + 4 \cos \frac{\pi}{2} = -2.$$

Такий самий результат можна дістати геометрично, побудувавши точку  $M$  і системи координат  $Oxy$  і  $OXY$ .

**Задача 7.** Задано точки  $A(0; -1; 2)$  і  $B(-1; 1; 4)$ . Знайти координати, довжину та напрямні косинуси вектора  $\overline{AB}$ .

**Розв'язання.** 3 формул  $\overline{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$ ,  
 $|\overline{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$  і  $\cos \alpha = \frac{a_x}{|\overline{a}|}$ ,  $\cos \beta = \frac{a_y}{|\overline{a}|}$ ,  $\cos \gamma = \frac{a_z}{|\overline{a}|}$   
 маємо  $\overline{AB} = (-1; 2; 2)$ ;  $|\overline{AB}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ ;  $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ ,  $\cos \beta = \cos \gamma = \frac{2}{3}$ .

**Задача 8.** Чи може вектор утворювати з осями координат кути  $\alpha = \beta = 60^\circ$ ,  $\gamma = 30^\circ$ ?

**Розв'язання.**  $\cos^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 30^\circ = \frac{5}{4} \neq 1$ , тому згідно з формулою  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  одержимо на це запитання негативну відповідь.

**Задача 9.** Вектор  $\vec{a}$  утворює з осями координат гострі кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , причому  $\alpha = 45^\circ, \beta = 60^\circ$ . Знайти його координати, якщо  $|\vec{a}| = 4$ .

**Розв'язання.** Оскільки  $\cos^2 45^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 \gamma = 1$ , то  $\cos^2 \gamma = 1 - \cos^2 45^\circ - \cos^2 60^\circ = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ . За умовою задачі кут  $\gamma$  гострий, тому  $\cos \gamma = \frac{1}{2}$  і кут  $\gamma = 60^\circ$ .

Координати вектора  $\vec{a}$  обчислюємо за формулами:  $a_x = |\vec{a}| \cos \alpha$ ,  $a_y = |\vec{a}| \cos \beta$ ,  $a_z = |\vec{a}| \cos \gamma$ .

$$a_x = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}; \quad a_y = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2; \quad a_z = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

$$\text{Отже, } \vec{a} = (2\sqrt{2}; 2; 2).$$

**Задача 10.** Знайти вектор  $\vec{a} = (a_x; -1; a_z)$ , колінеарний вектору  $\vec{b} = (1; -2; 3)$ .

**Розв'язання.** З умови  $\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$  маємо  $\frac{1}{a_x} = \frac{-2}{-1} = \frac{3}{a_z}$ ;  $a_x = \frac{1}{2}$ ,  $a_z = \frac{3}{2}$ .

**Задача 11.** Довести, що координати орта  $\vec{a}_0$  вектора  $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$  збігаються з напрямними косинусами даного вектора.

**Розв'язання.** 
$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{|\vec{a}|} (a_x; a_y; a_z) = \left( \frac{a_x}{|\vec{a}|}; \frac{a_y}{|\vec{a}|}; \frac{a_z}{|\vec{a}|} \right) = (\cos \alpha; \cos \beta; \cos \gamma).$$

**Задача 12.** Вектори  $\vec{a} = (2; -3; 6)$  та  $\vec{b} = (-1; 2; -2)$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , який прикладений до цієї ж точки і напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ .

**Розв'язання.** Враховуючи розв'язок задачі 2, візьмемо одиничні вектори  $\vec{a}_0$  та  $\vec{b}_0$  і знайдемо вектор  $\vec{c} = \vec{a}_0 + \vec{b}_0$ . Оскільки  $|\vec{a}_0| = |\vec{b}_0| = 1$ , то вектор  $\vec{c}$  буде напрямлений по бісектрисі кута між векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ .

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7;$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3;$$

$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \left( \frac{2}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{6}{7} \right), \quad \vec{b}_0 = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left( -\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3} \right);$$

$$\vec{c} = \left( \frac{2}{7} - \frac{1}{3}; -\frac{3}{7} + \frac{2}{3}; \frac{6}{7} - \frac{2}{3} \right) = \left( -\frac{1}{21}; \frac{5}{21}; \frac{4}{21} \right).$$

Шуканий вектор  $\vec{c}_0$  знаходимо за формулою:

$$\vec{c}_0 = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} \cdot |\vec{c}| = \sqrt{\frac{1+25+16}{21^2}} = \frac{\sqrt{42}}{21}.$$

Таким чином, 
$$\vec{c}_0 = \left( -\frac{1}{\sqrt{42}}; \frac{5}{\sqrt{42}}; \frac{4}{\sqrt{42}} \right).$$



**Задача 13.** Знайти центр маси однорідної трикутної пластинки з вершинами  $M_1(x_1; y_1)$ ,  $M_2(x_2; y_2)$ ,  $M_3(x_3; y_3)$ .

**Розв'язання.** Центр маси однорідної трикутної пластинки міститься в точці перетину медіан трикутника.

Нехай з вершини  $M_3$  проведена медіана  $M_3N$ , де точка  $N$  – середина відрізка  $M_1M_2$ .

$$x_N = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_N = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

Точка  $C$  перетину медіан ділить кожен медіану у відношенні 2:1, рахуючи від вершини трикутника, тобто точка  $C$  ділить медіану  $M_3N$  у відношенні  $\lambda = 2$ .

Координати точки  $C$  обчислимо за формулами:

$$x_C = \frac{x_{M_3} + \lambda x_N}{1 + \lambda}, \quad y_C = \frac{y_{M_3} + \lambda y_N}{1 + \lambda}.$$

Отже,

$$x_C = \frac{x_3 + 2 \frac{x_1 + x_2}{2}}{1 + 2} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3},$$

$$y_C = \frac{y_3 + 2 \frac{y_1 + y_2}{2}}{1 + 2} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}.$$

Таким чином, центр маси заданої трикутної пластинки міститься в точці  $C\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}; \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$ .

## Тема 2. Скалярний добуток двох векторів, його властивості, механічний зміст, обчислення та застосування

---

**Задача 1.** Знайти скалярний добуток векторів  $\vec{m} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$  і  $\vec{n} = 4\vec{a} + 5\vec{b}$ , якщо  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$ .

**Розв'язання.** Користуючись властивостями скалярного добутку, маємо

$$\begin{aligned}\vec{m} \cdot \vec{n} &= (2\vec{a} - 3\vec{b}) \cdot (4\vec{a} + 5\vec{b}) = \\ 8\vec{a}^2 + 10\vec{a} \cdot \vec{b} - 12\vec{a} \cdot \vec{b} - 15\vec{b}^2 &= 8\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 15\vec{b}^2.\end{aligned}$$

Застосовуючи формули  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$  і  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ , знаходимо

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = 8 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 15 \cdot 2^2 = -54.$$

**Задача 2.** Знайти довжину вектора  $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ , якщо  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 4$ ,  $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$ .

**Розв'язання.** За формулою  $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2}$  отримаємо

$$|\vec{c}| = \sqrt{\vec{c}^2} = \sqrt{(2\vec{a} - 3\vec{b})^2} = \sqrt{4\vec{a}^2 - 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 9\vec{b}^2} = \sqrt{124} = 2\sqrt{31}.$$

**Задача 3.** Обчислити роботу, що виконує сила  $\vec{F} = (2; -1; 4)$ , яка прямолінійно переміщує матеріальну точку з точки  $M(-1; 0; 3)$  в точку  $N(2; -3; 5)$ .

**Розв'язання.** Знайдемо вектор переміщення  $\vec{S} = \overline{MN} = (3; -3; 2)$ , тоді за формулами  $A = \vec{F} \cdot \vec{S}$  і  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$  робота  $A = \vec{F} \cdot \vec{S} = 17$ .

**Задача 4.** Задані вектори  $\vec{a} = (2; 0; -2)$  і  $\vec{b} = (-2; 1; 2)$ . Знайти проекцію вектора  $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$  на вектор  $\vec{b}$ .

**Розв'язання.** Знайдемо координати вектора  $\vec{c}$ :

$$\vec{c} = 2(2\vec{i} - 2\vec{k}) + (-2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k} = (2; 1; -2).$$

З формул  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{пр}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$  і  $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$  одержимо

$$\text{пр}_{\vec{b}} \vec{c} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}|} = \frac{2 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = -\frac{7}{3}.$$

**Задача 5.** Знайти проекцію вектора  $\vec{a} = (2; -3; 4)$  на вісь  $l$ , яка утворює з координатними осями рівні гострі кути.

**Розв'язання.** Оскільки  $\alpha = \beta = \gamma$ , то з формули  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  отримуємо  $3\cos^2 \alpha = 1$ ,  $\cos^2 \alpha = \frac{1}{3}$ ,  $\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

За умовою задачі кут  $\alpha$  гострий, тому  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

Одиничний вектор осі  $l$  має координати:

$$\vec{l}_0 = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right);$$

$$\text{пр}_l \vec{a} = \text{пр}_{\vec{l}_0} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{l}_0}{|\vec{l}_0|} = \vec{a} \cdot \vec{l}_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{3}{\sqrt{3}} + \frac{4}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

**Задача 6.** Трикутник заданий вершинами  $A(0; -1; 2)$ ,  $B(-1; -2; 7)$ ,  $C(1; -2; 6)$ . Знайти його внутрішній кут при вершині  $A$ .

**Розв'язання.** Користуючись формулою

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}, \text{ будемо мати}$$

$$\overrightarrow{AB} = (-1; -1; 5), \quad \overrightarrow{AC} = (1; -1; 4), \quad \cos \varphi = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{20}{9\sqrt{6}} \approx 0,91,$$

$\varphi \approx 25^\circ$ .

**Задача 7.** Дано вектори  $\vec{a} = (1; 2; 1)$ ,  $\vec{b} = (-2; 3; 3)$ ,  $\vec{c} = (3; -2; -4)$ . Знайти координати вектора  $\vec{d}$ , який перпендикулярний до вектора  $\vec{a}$  і задовольняє умови:  $\vec{d} \cdot \vec{b} = -1$ ,  $\vec{d} \cdot \vec{c} = -4$ .

**Розв'язання.** Нехай  $x, y, z$  – невідомі координати вектора  $\vec{d}$ . Застосуємо умову перпендикулярності двох векторів та формулу для обчислення скалярного добутку векторів:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0; \\ -2x + 3y + 3z = -1; \\ 3x - 2y - 4z = -4. \end{cases}$$

Розв'яжемо цю систему, наприклад, методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & -4 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & -1 \\ 0 & -8 & -7 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & -8 & -7 & -4 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 9 & 36 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Одержали еквівалентну систему:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0; \\ -y - 2z = -5; \\ z = 4, \end{cases}$$

розв'язок якої  $x = 2, y = -3, z = 4$ . Отже,  $\vec{d} = (2; -3; 4)$ .

# Тема 3. Векторний та мішаний добуток векторів, їхні властивості, геометричний зміст, обчислення та застосування

---

**Задача 1.** Обчислити  $\left| (3\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) \right|$ , якщо  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 4$ ,  $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$ .

**Розв'язання.**  $(3\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = 3(\vec{a} \times \vec{a}) - 6(\vec{a} \times \vec{b}) - (\vec{b} \times \vec{a}) + 2(\vec{b} \times \vec{b}) =$   
 $= -6(\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{a} \times \vec{b}) = -5(\vec{a} \times \vec{b}); \left| -5(\vec{a} \times \vec{b}) \right| = 5|\vec{a}||\vec{b}|\sin \frac{\pi}{2} = 5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 = 60.$

**Задача 2.** Знайти площу трикутника, заданого вершинами  $A(1;2;0)$ ,  $B(0;-2;1)$ ,  $C(-1;0;2)$ .

**Розв'язання.** Площа трикутника  $ABC$  дорівнює половині площі паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{AB}$  і  $\vec{AC}$ . Оскільки

$\vec{AB} = (-1; -4; 1)$ ,  $\vec{AC} = (-2; -2; 2)$  і за формулою  $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -4 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = -6\vec{i} - 6\vec{k},$$

то за формулою  $S = \left| \vec{a} \times \vec{b} \right|$  площа  $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right| = \frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 6^2} = 3\sqrt{2}$ .

**Задача 3.** Знайти момент сили  $\vec{F} = (1; -2; 4)$ , прикладеної до точки  $A(1; 2; 3)$ , відносно точки  $B(3; 2; -1)$ .

**Розв'язання.** Згідно з формулою  $\vec{M} = \overrightarrow{OA} \times \vec{F}$  момент сили  $\vec{M} = \overrightarrow{BA} \times \vec{F}$ . Оскільки  $\overrightarrow{BA} = (-2; 0; 4)$ , то

$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 8\vec{i} + 12\vec{j} + 4\vec{k}.$$

**Задача 4.** Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , який перпендикулярний до векторів  $\vec{a} = (1; 3; 0)$  і  $\vec{b} = (2; -3; 6)$ .

**Розв'язання.** Оскільки векторний добуток  $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$  – це вектор, який перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  та  $\vec{b}$ , то шуканий вектор  $\vec{p}_0$  колінеарний до вектора  $\vec{c}$ . Знайдемо вектор  $\vec{c}$ .

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 18\vec{i} - 6\vec{j} - 9\vec{k}.$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{18^2 + (-6)^2 + (-9)^2} = 3\sqrt{36 + 4 + 9} = 21; \quad \vec{c}_0 = \left( \frac{6}{7}; -\frac{2}{7}; -\frac{3}{7} \right).$$

$$\vec{p}_0 = \pm \vec{c}_0. \quad \text{Отже, } \vec{p}_0 = \left( \frac{6}{7}; -\frac{2}{7}; -\frac{3}{7} \right), \vec{p}'_0 = \left( -\frac{6}{7}; \frac{2}{7}; \frac{3}{7} \right).$$

**Задача 5.** Знайти об'єм тетраедра, заданого вершинами  $A(2;-1;0)$ ,  $B(5;5;3)$ ,  $C(3;2;-2)$ ,  $D(4;1;2)$ .

**Розв'язання.** Відомо, що об'єм тетраедра  $V_{ABCD}$ , побудованого на векторах  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AD}$ , дорівнює шостій частині об'єму паралелепіпеда, побудованого на цих векторах. Тому за формулою  $V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{ab}\overrightarrow{c}|$  маємо

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD}|.$$

Знаходимо вектори  $\overrightarrow{AB} = (3;6;3)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (1;3;-2)$ ,  $\overrightarrow{AD} = (2;2;2)$ . За

формулою  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$  одержимо

$$V = 1/6 \begin{vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

**Задача 6.** Визначити, при якому значенні  $\lambda$  вектори  $\vec{a} = (\lambda; 7; -1)$ ,  $\vec{b} = (2; \lambda; 1)$ ,  $\vec{c} = (-2; -5; -4)$  компланарні.

**Розв'язання.** Застосуємо умову компланарності векторів:

$$\begin{vmatrix} \lambda & 7 & -1 \\ 2 & \lambda & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{vmatrix} = 0, \text{ звідки отримаємо:}$$

$$-4\lambda^2 - 14 + 10 - 2\lambda + 56 + 3\lambda = 0,$$

тобто

$$4\lambda^2 - 3\lambda - 52 = 0.$$

Оскільки дискримінант  $D = 9 + 16 \cdot 52 = 841 > 0$ , то рівняння має два дійсних корені, а саме:  $\lambda_1 = 4$ ,  $\lambda_2 = -\frac{13}{4}$ .



**Задача 7.** Довести, що точки  $A(0;1;2)$ ,  $B(-2;0;-1)$ ,  $C(-1;5;8)$ ,  $D(1;6;11)$  лежать в одній площині.

**Розв'язання.** Точки  $A, B, C, D$  лежать в одній площині, якщо вектори  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  компланарні. Знаходимо вектори  $\overrightarrow{AB} = (-2; -1; -3)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (-1; 4; 6)$ ,  $\overrightarrow{AD} = (1; 5; 9)$ .

Оскільки мішаний добуток

$$\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 9 \end{vmatrix} = 0,$$

то вектори  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  компланарні, тому задані точки лежать в одній площині.

**Задача 8.** Яку трійку утворюють вектори  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , якщо  $\vec{a} = (1; 2; 3)$ ,  $\vec{b} = (-1; 0; 2)$ ,  $\vec{c} = (1; -2; 5)$ ?

**Розв'язання.** Оскільки мішаний добуток

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 24 > 0,$$

то дані вектори утворюють праву трійку.

# Завдання розрахункової роботи

## ВАРІАНТ 1

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 2.1$ ,  $\alpha = \pi/3$ ,  $\beta = 4\pi/3$ .
2. Паралелограм  $ABCD$  побудовано на векторах  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$  і  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ,  $O$  – точка перетину діагоналей,  $K$  – середина  $BC$ . Знайти вектори  $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CO}$  і  $\overrightarrow{KD}$ , якщо:

$$\vec{a} = (2; 3; -1), \quad \vec{b} = (4; 0; 2).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (-3; 0; 4), \quad \vec{b} = (1; 3; -3\sqrt{10}).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(1; 2; 1), \quad B(2; -1; 3), \quad C(3; \alpha; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (2; 1; 0), \quad \vec{b} = (4; 3; -3), \quad \vec{c} = (-6; 5; 7), \quad \vec{d} = (34; 5; -26).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати його вершин:

$$A(2; -1; 3), \quad B(1; 1; 1), \quad C(0; 0; 5).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = 5\vec{p} + 2\vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} - 3\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2\sqrt{2}, \quad |\vec{q}| = 3, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/4.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (1; -4; -3)$ ,  $\left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (2; 3; -1), \quad M_1(0; 4; -1), \quad M_2(3; 1; 2).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (2; 1; -4), \quad \vec{b} = (1; 3; 5).$$

11. Обчислити площу трикутника  $ABC$  і довжину висоти  $AH$ , якщо:  
 $A(2; 0; -1)$ ,  $B(3; 1; -4)$ ,  $C(2; 0; 5)$ .

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 2\vec{p} + \vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} + 3\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 4, \quad |\vec{q}| = 1, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/6.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки  $B$ . Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (2; 4; -1), \quad \vec{f}_2 = (0; 0; -3), \quad \vec{f}_3 = (-4; 1; 7), \quad B(2; 1; -2).$$

14. Точки  $A, B, C$  і  $D$  є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(2; 3; -1), \quad B(4; 0; 2), \quad C(2; 3; -1), \quad D(8; -6; 8).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки  $A, B, C, D$ , якщо:

$$A(3; 3; 3), \quad B(2; 9; 0), \quad C(1; 5; 6), \quad D(7; 6; 4).$$

## ВАРІАНТ 2

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 6, \alpha = \pi/2, \beta = \pi/4$ .
2. Паралелограм  $ABCD$  побудовано на векторах  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$  і  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ,  $O$  – точка перетину діагоналей,  $K$  – середина  $BC$ . Знайти вектори  $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CO}$  і  $\overrightarrow{KD}$ , якщо:

$$\vec{a} = (0; 1; 3), \quad \vec{b} = (-1; 2; 4).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (3; -4; 5\sqrt{3}), \quad \vec{b} = (2; 3; -6).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(0; 0; 2), \quad B(3; 4; -1), \quad C(\alpha; 2; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (1; 2; 3), \quad \vec{b} = (-1; 3; 2), \quad \vec{c} = (7; -3; 5), \quad \vec{d} = (6; 10; 17).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати його вершин:

$$A(-1; 0; 4), \quad B(2; 1; -3), \quad C(2; -1; 1).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = \vec{p} - 3\vec{q}, \quad \vec{b} = 2\vec{p} + 5\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 4, \quad |\vec{q}| = 3, \quad \left( \vec{p}, \wedge \vec{q} \right) = 4\pi/3.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (-5; 3; 12)$ ,  $\left( \vec{p}, \wedge \vec{j} \right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (0; 3; 4), \quad M_1(2; 1; 1), \quad M_2(4; 3; 0).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (7; 2; 3), \quad \vec{b} = (8; 0; -6).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:

$$A(3; 7; -2), \quad B(0; 1; 1), \quad C(3; 1; -4).$$

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 3\vec{p} + \vec{q}, \quad \vec{b} = 2\vec{p} - \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2, \quad |\vec{q}| = 3, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/4.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (2; 0; -1), \quad \vec{f}_2 = (4; 5; 2), \quad \vec{f}_3 = (3; 1; -3), \quad B(4; 1; 4).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(2; 0; -1), \quad B(3; 1; -2), \quad C(5; 7; 1), \quad D(5; 3; -4).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(4; 4; 3), \quad B(10; 1; 6), \quad C(7; 8; 7), \quad D(2; -2; 1).$$

### ВАРІАНТ 3

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}|=9, \quad \alpha = \beta = \gamma$  (кути гострі).
2. Паралелограм  $ABCD$  побудовано на векторах  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$  і  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ,  $O$  – точка перетину діагоналей,  $K$  – середина  $BC$ . Знайти вектори  $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CO}$  і  $\overrightarrow{KD}$ , якщо:

$$\vec{a} = (2; 4; 5), \quad \vec{b} = (-2; -1; 0).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (3\sqrt{10}; -3; -1), \quad \vec{b} = (-3; -4; 2\sqrt{6}).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(-1; 2; 4), \quad B(2; 0; -3), \quad C(\alpha; \beta; -1).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (4; 7; 8), \quad \vec{b} = (9; 1; 3), \quad \vec{c} = (2; -4; 1), \quad \vec{d} = (1; -13; -13).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(2; 4; -1), \quad B(0; 3; -2), \quad C(4; 1; -1).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = 2\vec{p} + 7\vec{q}, \quad \vec{b} = -3\vec{p} + \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2\sqrt{2}, \quad |\vec{q}| = 4, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = 3\pi/4.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (2; 1; -2)$ ,  $\left(\vec{p}, \hat{\vec{k}}\right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (7; 1; -1), \quad M_1(0; 3; 4), \quad M_2(7; -1; -1).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (3; 0; 1), \quad \vec{b} = (4; 6; -1).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:

$$A(3; 1; -1), \quad B(2; 5; -1), \quad C(2; 1; 8).$$

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 3\vec{p} - 2\vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} + 5\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 4, \quad |\vec{q}| = \frac{1}{2}, \quad \left(\vec{p}, \vec{q}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (3; 1; 2), \quad \vec{f}_2 = (4; -1; -4), \quad \vec{f}_3 = (2; 4; 0), \quad B(7; 1; -3).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(1; -1; 2), \quad B(4; 0; 2), \quad C(5; -1; 7), \quad D(10; 2; 2).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(3; -2; 1), \quad B(-2; -1; 6), \quad C(-1; 6; 5), \quad D(7; 3; 4).$$

#### ВАРІАНТ 4

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}|=13, \alpha = \beta = \gamma$  (кути тупі).
2. В трикутнику  $ABC$  точка  $M$  – середина відрізка  $AB$  і  $O$  – точка перетину медіан. Знайти координати векторів  $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AO}$  і  $\overrightarrow{MO}$ , якщо:

$$\overrightarrow{AB} = (2; -1; 2), \quad \overrightarrow{AC} = (3; 1; 7).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (0; -6; 8), \quad \vec{b} = (2; -3; 6).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(1; 0; 7), \quad B(3; 2; 6), \quad C(\alpha; 4; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (8; 2; 3), \quad \vec{b} = (4; 6; 10), \quad \vec{c} = (3; -2; 1), \quad \vec{d} = (7; 4; 11).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(2; -3; 0), \quad B(0; 9; -6), \quad C(3; 1; -2).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = \vec{p} + 4\vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} - \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2, \quad |\vec{q}| = 5, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = 2\pi/3.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (1; 2; -3), \left( \vec{p}, \vec{j} \right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (6; 4; 3), \quad M_1(2; -1; 2), \quad M_2(7; 6; 4).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (4; 1; -1), \quad \vec{b} = (3; 0; 1).$$



11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:  
 $A(2;-3;7)$ ,  $B(0;5;3)$ ,  $C(2;1;-1)$ .

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = \vec{p} - 2\vec{q}, \quad \vec{b} = 2\vec{p} + 3\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2, \quad |\vec{q}| = 3\sqrt{2}, \quad \left(\vec{p}, \vec{q}\right) = 3\pi/4.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (4;6;0), \quad \vec{f}_2 = (1;2;8), \quad \vec{f}_3 = (3;-1;2), \quad B(7;1;6).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(-2;1;-3), \quad B(1;-1;3), \quad C(0;2;-1), \quad D(-8;5;-15).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(3;4;-9), \quad B(5;0;4), \quad C(6;8;2), \quad D(-2;5;4).$$

## ВАРІАНТ 5

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 15.5, \beta = \pi/4, \gamma = \pi/3$ .
2. В трикутнику  $ABC$  точка  $M$  – середина відрізка  $AB$  і  $O$  – точка перетину медіан. Знайти координати векторів  $\vec{AM}, \vec{AO}$  і  $\vec{MO}$ , якщо:

$$\vec{AB} = (0; -2; 1), \quad \vec{AC} = (3; -2; -2).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (3; -4; -5\sqrt{3}), \quad \vec{b} = (2\sqrt{6}; -4; -3).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(2; 1; -1), \quad B(3; 0; 3), \quad C(6; \alpha; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (10; 3; 1), \quad \vec{b} = (1; 4; 2), \quad \vec{c} = (3; 9; 2), \quad \vec{d} = (19; 30; 7).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(4; -2; 1), \quad B(3; 0; 5), \quad C(2; 1; -4).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = 5\vec{p} + 2\vec{q}, \quad \vec{b} = 3\vec{p} - \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2\sqrt{3}, \quad |\vec{q}| = 1/2, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/6.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (2; -3; 6), \left(\vec{p}, \hat{\vec{i}}\right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (3; 1; -7), \quad M_1(2; 3; -1), \quad M_2(5; 4; 5).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (8; 6; 3), \quad \vec{b} = (2; 4; 7).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:  
A(3;4;5), B(5;6;1), C(10;4;6).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = \vec{p} - 4\vec{q}, \quad \vec{b} = 3\vec{p} + \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 1, \quad |\vec{q}| = 2, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/6.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (3; 2; -1), \quad \vec{f}_2 = (2; 3; -3), \quad \vec{f}_3 = (4; 1; -3), \quad B(0; 2; -2).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(2; 1; 0), \quad B(4; 1; -2), \quad C(0; 0; 5), \quad D(-2; 1; 4).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(5; 10; 6), \quad B(-2; 0; 2), \quad C(1; 0; 0), \quad D(3; 2; 5).$$

## ВАРІАНТ 6

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}|=17, \beta=\pi/2, \gamma=7\pi/6$ .
2. В трикутнику  $ABC$  точка  $M$  – середина відрізка  $AB$  і  $O$  – точка перетину медіан. Знайти координати векторів  $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AO}$  і  $\overrightarrow{MO}$ , якщо:

$$\overrightarrow{AB}=(5;7;0), \quad \overrightarrow{AC}=(-4;1;1).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a}=(-3;-1;3\sqrt{10}), \quad \vec{b}=(1;-3;\sqrt{6}).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(3;-2;1), \quad B(4;-2;-1), \quad C(\alpha;\beta;2).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a}=(2;4;1), \quad \vec{b}=(1;3;6), \quad \vec{c}=(5;3;1), \quad \vec{d}=(24;20;6).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(2;0;2), \quad B(6;7;1), \quad C(2;0;-3).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a}=3\vec{p}+4\vec{q}, \quad \vec{b}=\vec{p}-2\vec{q}, \quad |\vec{p}|=3, \quad |\vec{q}|=\sqrt{2}, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right)=5\pi/4.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q}=(3;4;-1), \left(\vec{p}, \hat{\vec{k}}\right)=\pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f}=(0;3;-2), \quad M_1(2;-3;0), \quad M_2(4;6;7).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (7; 5; 5), \quad \vec{b} = (3; 10; 5).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти АН, якщо:  
A(3;1;-1), B(2;-2;4), C(5;-5;3).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 4\vec{p} + \vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} - \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 7, \quad |\vec{q}| = 2, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/4.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки В. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (2; 0; 2), \quad \vec{f}_2 = (3; 0; 1), \quad \vec{f}_3 = (-3; -1; 0), \quad B(5; 1; 5).$$

14. Точки А, В, С і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(2; 4; 4), \quad B(-1; 3; 0), \quad C(2; 1; -2), \quad D(8; 6; 12).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки А, В, С, D, якщо:

$$A(-5; -1; 1), \quad B(4; 5; 4), \quad C(3; 4; 4), \quad D(2; 0; 2).$$

## ВАРІАНТ 7

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 2, \beta = 3\pi/2, \gamma = 3\pi/4$ .

2. В трикутнику  $ABC$  проведено медіани  $AD, BE$  і  $CF$ . Знайти координати векторів  $\vec{AD}, \vec{BE}$  і  $\vec{CF}$ , якщо:

$$\vec{AB} = (2; 0; 5), \quad \vec{AC} = (3; -1; -1).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (2\sqrt{2}; 4; -5), \quad \vec{b} = (-9; -5; \sqrt{15}).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(2; 4; 1), \quad B(3; 0; 2), \quad C(\alpha; -1; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (1; 7; 3), \quad \vec{b} = (3; 4; 2), \quad \vec{c} = (4; 8; 5), \quad \vec{d} = (7; 32; 14).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(3; 1; -4), \quad B(1; 2; 3), \quad C(0; 2; 1).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = \vec{p} + 6\vec{q}, \quad \vec{b} = 4\vec{p} - 2\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 2, \quad |\vec{q}| = 4, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/2.$$

8. Знайти вектор  $\vec{p}$ , перпендикулярний до вектора  $\vec{q}$ , при умові, що їх довжини однакові і  $\vec{q} = (-1; 2; 3), \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/2$ .

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (2; -2; 7), \quad M_1(2; -4; 7), \quad M_2(-4; 4; 8).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (0; 4; 7), \quad \vec{b} = (-2; 3; 5).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:  
A(5;-5;1), B(0;3;-2), C(7;2;1).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 10\vec{p} + \vec{q}, \quad \vec{b} = 3\vec{p} - 2\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 4, \quad |\vec{q}| = 1, \quad \left(\vec{p}, \hat{\vec{q}}\right) = \pi/6.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (3; -1; 2), \quad \vec{f}_2 = (3; 1; 3), \quad \vec{f}_3 = (4; 1; -4), \quad B(7; 1; -7).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(1; 1; -1), \quad B(5; 4; 0), \quad C(3; -3; 2), \quad D(-3; -2; -2).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(2; 5; -6), \quad B(5; 4; 5), \quad C(5; 3; -3), \quad D(0; 8; 6).$$

## ВАРІАНТ 8

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 3.2, \beta = 3\pi/2, \gamma = \pi/6$ .

2. В трикутнику  $ABC$  проведено медіани  $AD, BE$  і  $CF$ . Знайти координати векторів  $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}$  і  $\overrightarrow{CF}$ , якщо:

$$\overrightarrow{AB} = (3; 1; -1), \quad \overrightarrow{AC} = (-2; 1; 0).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (-6; 0; 8), \quad \vec{b} = (-3; 1; \sqrt{6}).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(3; 1; 2), \quad B(4; 2; -1), \quad C(\alpha; \beta; 0).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (1; -2; 3), \quad \vec{b} = (4; 7; 2), \quad \vec{c} = (6; 4; 2), \quad \vec{d} = (14; 18; 6).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(7; -1; 1), \quad B(-1; 4; 3), \quad C(2; -1; 3).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = 8\vec{p} + 3\vec{q}, \quad \vec{b} = 2\vec{p} - \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 1/2, \quad |\vec{q}| = 4\sqrt{3}, \quad \left(\vec{p}, \vec{q}\right) = 5\pi/6.$$

8. Задано вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ . Знайти значення  $p$ , при якому вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  будуть перпендикулярні, якщо :

$$\vec{a} = (3; 2; p), \quad \vec{b} = (-4; p; 3).$$

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (7; 2; 2), \quad M_1(0; 4; -3), \quad M_2(1; 1; -2).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:



$$\vec{a} = (-2; 10; 3), \quad \vec{b} = (1; 1; -1).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:  
A(2; -4; 1), B(2; 1; 0), C(-3; -2; 1).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 6\vec{p} - \vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} + 2\vec{q}, \quad |\vec{p}| = 4, \quad |\vec{q}| = 1, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/4.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (2; 1; 0), \quad \vec{f}_2 = (3; 1; -1), \quad \vec{f}_3 = (5; 1; -1), \quad B(3; 1; -3).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(3; -1; 0), \quad B(7; 7; 1), \quad C(3; -2; -2), \quad D(-1; -9; -1).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(3; 6; -3), \quad B(5; 1; 7), \quad C(7; 7; 1), \quad D(1; 9; 7).$$

## ВАРІАНТ 9

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 21, \beta = 7\pi/6, \gamma = \pi/2$ .

2. В трикутнику  $ABC$  проведено медіани  $AD, BE$  і  $CF$ . Знайти координати векторів  $\vec{AD}, \vec{BE}$  і  $\vec{CF}$ , якщо:

$$\vec{AB} = (4; 1; -1), \quad \vec{AC} = (7; 6; 0).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (-4; -8; 1), \quad \vec{b} = (-4; 2; 4).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(2; 4; 3), \quad B(3; 0; 5), \quad C(\alpha; \beta; 6).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (1; 4; 3), \quad \vec{b} = (6; 8; 5), \quad \vec{c} = (3; 1; 4), \quad \vec{d} = (21; 18; 33).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(10; -2; 3), \quad B(8; 0; -3), \quad C(2; -2; -2).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = 4\vec{p} - 3\vec{q}, \quad \vec{b} = 4\vec{p} + 2\vec{q}, \quad |\vec{p}| = \sqrt{2}/4, \quad |\vec{q}| = 3, \quad \left(\vec{p}, \vec{q}\right) = \pi/4.$$

8. Задано вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ . Знайти значення  $p$ , при якому вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  будуть перпендикулярні, якщо:

$$\vec{a} = (p; 4; 1), \quad \vec{b} = (2; p; -4).$$

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (10; 3; 3), \quad M_1(0; 2; -2), \quad M_2(6; -4; 5).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (4; 2; -1), \quad \vec{b} = (6; 0; 3).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти АН, якщо:  
A(-4; 2; 0), B(5; -5; 1), C(2; 3; -2).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 5\vec{p} - 6\vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} + \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 5, \quad |\vec{q}| = 3, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = 5\pi/6.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки В. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (5; 1; -2), \quad \vec{f}_2 = (2; 1; -1), \quad \vec{f}_3 = (1; -1; 3), \quad B(2; 0; 4).$$

14. Точки А, В, С і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(3; 4; -1), \quad B(2; 1; -2), \quad C(4; 3; 1), \quad D(4; 7; 0).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки А, В, С, D, якщо:

$$A(4; 7; 4), \quad B(6; -2; 8), \quad C(8; 3; 3), \quad D(3; -2; 9).$$

## ВАРІАНТ 10

1. Знайти координати вектора  $\vec{a}$ , якщо відома його довжина і кути  $\alpha, \beta, \gamma$ , які утворює вектор  $\vec{a}$  з осями координат:  $|\vec{a}| = 5.5$ ,  $\beta = \pi/2$ ,  $\gamma = 5\pi/6$ .
2. Точки  $K$  і  $L$  служать серединами сторін  $BC$  і  $CD$  паралелограма  $ABCD$ . Знайти вектори  $\vec{BC}$  і  $\vec{AK}$ , якщо:

$$\vec{AB} = (2; -1; 3), \quad \vec{AL} = (4; 0; -7).$$

3. Вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  прикладені до однієї точки. Знайти одиничний вектор  $\vec{c}_0$ , напрямлений по бісектрисі кута, утвореного векторами  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = (0; -5; 5\sqrt{3}), \quad \vec{b} = (-4; 1; 8).$$

4. Дано точки  $A, B, C$ . При яких значеннях  $\alpha$  і  $\beta$  точка  $C$  лежить на прямій  $AB$ , якщо:

$$A(3; -1; 2), \quad B(4; 2; -3), \quad C(2; \alpha; \beta).$$

5. Задано чотири вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  в деякому базисі. Показати, що вектори  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  утворюють базис і знайти координати вектора  $\vec{d}$  в цьому базисі, якщо:

$$\vec{a} = (2; 7; 3), \quad \vec{b} = (3; 1; 8), \quad \vec{c} = (2; -7; 4), \quad \vec{d} = (16; 14; 27).$$

6. Знайти косинус внутрішнього кута  $A$  трикутника  $ABC$ , якщо задано координати вершин:

$$A(-2; 5; -1), \quad B(0; 4; -1), \quad C(1; -1; 3).$$

7. Обчислити довжини діагоналей паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо:

$$\vec{a} = \vec{p} - 6\vec{q}, \quad \vec{b} = 5\vec{p} + \vec{q}, \quad |\vec{p}| = 3, \quad |\vec{q}| = 7, \quad \left( \vec{p}, \vec{q} \right) = \pi/2.$$

8. Задано вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ . Знайти значення  $p$ , при якому вектори  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$  будуть перпендикулярні, якщо :

$$\vec{a} = (5; p; -2), \quad \vec{b} = (p; 4; 1).$$

9. Знайти роботу  $A$  сили  $\vec{f}$  по переміщенню матеріальної точки з положення  $M_1$  в положення  $M_2$  вздовж прямої  $M_1M_2$ , якщо:

$$\vec{f} = (2; -3; 4), \quad M_1(5; 4; -3), \quad M_2(6; 2; -1).$$

10. Знайти одиничний вектор  $\vec{p}_0$ , перпендикулярний до векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , заданих своїми координатами:

$$\vec{a} = (6; -4; 3), \quad \vec{b} = (3; 2; 9).$$

11. Обчислити площу трикутника ABC і довжину висоти AH, якщо:  
A(3;3;-3), B(1;-2;7), C(5;1;2).

12. Знайти модуль векторного добутку векторів  $\vec{a}$  і  $\vec{b}$ , якщо відомо:

$$\vec{a} = 7\vec{p} - 2\vec{q}, \quad \vec{b} = \vec{p} + 3\vec{q}, \quad |\vec{p}| = \frac{1}{2}, \quad |\vec{q}| = 2, \quad \left(\vec{p}, \vec{q}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

13. Три сили  $\vec{f}_1, \vec{f}_2$  і  $\vec{f}_3$  прикладені до точки B. Обчислити момент рівнодійної цих сил  $\vec{F}$  відносно початку координат, якщо:

$$\vec{f}_1 = (3; 1; -1), \quad \vec{f}_2 = (2; 1; 1), \quad \vec{f}_3 = (4; 0; -2), \quad B(7; 7; 1).$$

14. Точки A, B, C і D є вершинами чотирикутника. Довести, що цей чотирикутник – плоский, якщо:

$$A(1; -1; 0), \quad B(4; 3; 5), \quad C(-5; 1; -2), \quad D(-2; -5; -5).$$

15. Обчислити об'єм тетраедра, вершинами якого є точки A, B, C, D, якщо:

$$A(0; 5; 6), \quad B(7; 3; 3), \quad C(2; 9; 0), \quad D(5; 6; 7).$$