

Др Микола Чайковський.

(Рава руська).

Як упорядкувати множину вимірних десяточних чисел?

(Dr Mykola Čajkovskij: Wie kann man die Menge der rationalen Dezimalzahlen anordnen?)

Георг Кантор доказав, що множина звичайних, вимірних дробів є відчислима; порядкує він її так, що збирає в групи всі дроби, яких сума чисельника і знаменника однакова, $s = m + n$, а потім укладає серед кожної групи поодинокі дроби в такій черзі:

$$\frac{s-1}{1}, \quad \frac{s-2}{2}, \quad \frac{s-3}{3}, \dots, \quad \frac{s-k}{k}, \dots, \quad \frac{1}{s-1}.$$

Отсе впорядковане має ту недочоту, що кожний дріб виступає у множині безліч разів, раз у незведимій формі $\frac{m}{n}$, коли $(m, n) = 1$, а потім у кожній групі λs як $\frac{\lambda m}{\lambda n}$.

При порядкованю множини вимірних десяточних чисел легко можна оминати ту недогідність, яка тут іще більше завважала би, бо-ж коли ми дроби $\frac{m}{n}$ і $\frac{\lambda m}{\lambda n}$ ще таки можемо вважати двома різними числами, то не можемо того сказати нпр. про числа 0.1 і 0.10, 0.100 і т. д.

В отсій замітці переведемо доказ, що множина всіх десяточних чисел є відчислима, а уладимо його так, щоби можна було порядкове місце кожного елемента представити як функцію його цифр.

1. До тої ціли всі десяточні числа — отже і цілі числа і десяточні дроби (т. зв. „чисті числа“ і „чисті дроби“) і врешті

цілі числа з десяточними місцями („мішані числа“) — ділимо на групи відповідно до кількості цифер; під α -цифровим числом будемо розуміти або α -цифрове ціле число або α -цифровий „чистий дріб“ або „мішане“ число, що має перед точкою β по точці разом α цифер.

Дальше серед одної групи ділимо числа на класи так, що до класи з характеристикою (p, q) належать усі числа, які мають p цілих і q десяточних місць; отже до першої класи $(\alpha, 0)$, належать „чисті“ числа, до останньої $(0, \alpha)$, „чисті“ дробни, а до прочих $\alpha-1$ клас усі „мішані“ числа.

Супроти того упорядкування поодиноких груп і клас буде таке:

I. $(1, 0)$: числа 1—9; $(0, 1)$: дробни 0·1—0·9;

II. $(2, 0)$: числа 10—99; $(1, 1)$: числа 1·1 до 9·9 (з виключенням чисел цілих, т. є. форми $\alpha \cdot 0$, бо ті належать до $(1, 0)$); $(0, 2)$: дробни 0·01—0·99;

III. $(3, 0)$: числа 100—999; $(2, 1)$: число 10·1 до 99·9; $(1, 2)$: числа 1·00 до 9·99 (в обох разях виключені числа форми $\alpha \beta \cdot 0$ і $\alpha \cdot \beta 0$); $(0, 3)$: дробни 0·001—0·999;

2. Тепер треба нам означити місце даного числа у його класі.

а). Коли се ціле число, n -цифрове, x , то воно займає місце $o \cdot 10^{n-1} - 1$ менше ніж його величина, бо його класа $(n, 0)$ зачинаєть ся від 10^{n-1} , а всі менші числа, у кількості 10^{n-1} , належать до попередніх груп, отже

$$N_{n, 0}(x) = x - (10^{n-1} - 1). \quad (1)$$

Класа $(n, 0)$ містить у собі $9 \cdot 10^{n-1}$ елементів, бо зачинаєть ся числом 10^{n-1} , а кінчаєть ся на $10^n - 1$.

б). Коли n -цифрове число x є „чистим“ дробом, тоді його місце є:

$$N_{n, 0}(x) = (x) - E_{10}^{(x)}, \quad (2)$$

де (x) означає ціле число, яке одержимо, коли в дробі x скасуємо десяточну точку, а $E_{10}^{(x)}$ — символъ Лежандра — означає найбільше ціле число, що містить ся у дробі $\alpha \geq 1$.

Формулку (2). легко доказати. Іменно, коли випишемо всі дробни з n цифрами, починаючи з 0·00... 01, то до класи $(0, n)$ будуть належати тільки ті, що не закінчені нулем, отже всі дробни з кінцевою нулем треба викинути, а є їх як раз стільки, скільки десятків містить ся у числі (x) .

Кляса (o, n) містить у собі, так само як і (n, o) , $9 \cdot 10^{n-1}$ елементів.

в). Коли ж урешті n -цифрове мішане число x має $n-r$ цілих, а q дробових місць, то

$$N_{n-r, r}(x) = (x) - E \frac{(x)}{10} - (10^{n-1} - 1). \quad (3).$$

Тут іменно треба — в порівнянню до кляси (o, n) виключити число всіх попередніх ґруп. А саме, кожду з кляс $(n-r, r)$ одержимо, коли в усіх числах кляси (o, n) точку пересунемо о r місць на право. Через те числа, що їх перші цифри були нулями, мати муть менчу скількість цифер, бо при пересуненю точки на право мати ме значіне тільки одна нуля, що стоїть перед точкою; так нпр. переходячи з $(0, 3)$ до $(2, 1)$ і $(1, 2)$ мусимо відкинути числа, що повстали з дробів $0.001 - 0.099$, а в їх усіх $99 = 10^2 - 1$.

Взагалі усунемо тут стільки елементів, скільки їх міститься у клясах від $(0, 1)$ до $(0, n-1)$ вкл., т. є $10^{n-1} - 1$.

Кожда з мішаних n -цифрових кляс містить у собі 9^n елементів.

Формулки (1) — (3) можемо легко зібрати в одну при помочи функції $\vartheta(a)$, яку схарактеризуємо так:

$$\vartheta(0) = 0, \quad \vartheta(a) = -1 \text{ для } a > 0;$$

тоді буде загально;

$$N_{n-r, r}(x) = (x) + \vartheta(r) \cdot E \frac{(x)}{10} + \vartheta(n-r) \cdot (10^{n-1} - 1). \quad (1).$$

3. Знаючи місце кожного елементу в внутрі його кляси, можемо легко обчислити місце давого числа у цілій множині.

Нехай число x належить до кляси (p, q) , т. є має p цифер перед точкою і q по точці. Тоді для означеня його місця у множині мусимо знати:

а) скількість елементів, що містять ся у всіх попередніх $p+q-1$ ґрупах разом;

б) скількість елементів кляс, які стоять у дотичній ґрупі перед даною клясою: $(p+q, 0)$, $(p+q-1, 1)$, ..., $(p+1, q-1)$;

в) місце числа x у клясі (p, q) .

Сума тих трьох чисел дасть бажане місце числа x у множині; назначимо його $\mathfrak{M}(x)$.

а) Для означеня скількості елементів попередніх ґруп зважмо, що в кождій k -цифровій ґрупі є $(k+1)$ кляс; з того дві скрайні — одна відповідає чистим числам, друга чистим дробам — мають по $9 \cdot 10^{k-1}$ елементів, а $(k-1)$ прочих, що від-

повідують мішаним числам, по 9^k елементів. Загалом отже k -цифрова група має

$$T_k = 2 \cdot 9 \cdot 10^{k-1} + (k-1) \cdot 9^k$$

елементів, а всі групи разом, від 1-ої до k - тої включно:

$$S_m = \sum_{k=1}^m T_k = 2 \cdot 9 \cdot \sum_{\lambda=0}^{m-1} 10^\lambda + 9^2 \cdot \sum_{\lambda=0}^{m-1} \lambda \cdot 9^{\lambda-1}$$

елементів. Перша сума є $\frac{10^m - 1}{9}$, друга $\frac{(8m-9) \cdot 9^{m-1} + 1}{8^2}$, *

отже загалом:

$$S_m = 2(10^m - 1) + \frac{9^2}{8^2} [(8m-9) \cdot 9^{m-1} + 1]. ** \quad (4)$$

б). Коли число x не належить до класу $(m, 0)$, мусимо обчислити скількість місць усіх попередніх клас аж до $(m-r+1, r-1)$ вкл., де $r-1 \leq m$. Тоді до S_m треба дочислити

$$\Sigma_{m-r, r} = 9 \cdot 10^{m-1} + (r-1) \cdot 9^m; \quad (5)$$

коли x є чистим дробом, мати мемо додати

$$\Sigma_{0, m} = 9 \cdot 10^{m-1} + m \cdot 9^m; \quad (5a)$$

коли воно ціле, отся сума відпаде, отже треба покласти для $r=0$

$$\Sigma_{m, 0} = 0 \quad (5b)$$

Щоби й ті три формулки зєдинити, приймім, що

$$\Sigma_{m-r, r} = 9 \cdot 10^{m-1} - (r-1) \cdot 9^m \cdot \mathcal{D}(r), \quad (II)$$

де $\mathcal{D}(r)$ здефініюване рівнянями:

$$\mathcal{D}(0) = \left(\frac{10}{9}\right)^{m-1}, \mathcal{D}(a) = -1 \text{ для } a \setminus 0.$$

Загалом є отже:

$$\mathfrak{N}(x) = S_{p+q-1} + \Sigma_{p, q} + N_{p, q}(x). \quad (6)$$

Формулка (4), (I) і (II) подають величини S , N і Σ однозначно, отже наша множина впорядкована однозначно і то так, що місце кожного елементу в ній подане як функція його цифер.

*) Ряд $S_n = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$ є похідною ряду $\sigma_n = x + x^2 + \dots + x^n$, отже його сума похідною суми $\sigma_n = \frac{x(x^n-1)}{x-1}$, т. є:

$$S_n = \frac{(nx - n - 1)x^{n+1}}{(x-1)^2}$$

**) Сума у скобці є подільна на 8^2 , бо $9^\lambda \equiv 8\lambda + 1 \pmod{8^2}$, отже $(8m-9) \cdot 9^{m-1} + 1 \equiv 0 \pmod{8^2}$; отже S_m є дійсно ціле число.

Табелька чисел T_m і S_m :

m	T_m	S_m
1	18	18
2	261	279
3	3.258	3.537
4	37.683	41.220
5	416.196	457.416
6	2,095.245	2,542.661

INHALT.

Es wird der Beweis erbracht, daß die Menge aller rationalen Dezimalzahlen — ganze Zahlen und echte Dezimalbrüche einbegriffen — abzählbar ist. Hierbei werden alle k -stelligen Zahlen in Gruppen zusammengefaßt und jede der Gruppen in $(k+1)$ Klassen derart eingeteilt, daß zur ersten Klasse $(k, 0)$ ganze, k -stellige Zahlen, zur zweiten $(k-1, 1)$ Zahlen mit $(k-1)$ ganzen und 1 Dezimalstelle, ..., endlich zur letzten $(0, k)$ echte Dezimalbrüche gehören. Nun kann man aber auch die Stelle, die ein gegebenes Element inmitten der ganzen Menge einnimmt, auch als Funktion des Ziffern des Elements angeben; das geschieht mit Hilfe der Formeln (4), (I), (III) und (6).
