

Із сучасних дослідів над магнетизмом.

написав

др. Роман Цегельський.

1. Вступ.

Відповідно до сучасного стану науки ділимо всі тіла з огляду на їх магнетні прикмети на три групи: на діямагнетні, парамагнетні і ферромагнетні. До першої групи належить переважна часть елементів¹⁾ і хемічних сполук; між останніми подибуємо товщеві і ароматичні сполуки. До парамагнетних тіл належить менша часть елементів і розмірно невелике число хемічних сполук, головнo соли хрому, мангану, заліза, нікю, кобальту і міді. Ферромагнетними тілами є залізо, нікель, кобальт, манган, магнетит і піротит, вкінці деякі амальгами і стопи ферромагнетних металів, головнo стопи Heusler'a.

Потреба сего поділу проявила ся вже давно. Почин до того дав ще Brugmanns 1778 р. Він досліджував магнетні прикмети богатх тіл. Між иншим найшов, що часово стають магнетними сїрчан, азотан і хлорак заліза (залізаві сполуки), як в цїпкім, так і в розпущенім стані. Заразом зробив епохальне відкритє, що магнетні бігуни відпихають чистий візмут. В творі його, що вийшов в Leyden 1778 п. з. *Magnetismus...*²⁾, стрічаємо натяки на поділ тіл на згадані три групи („*omne ferrum, omneque corpus ferrum continens, eo ipso dum trahitur, polos recipiat*“; р. 72). Однак перший

¹⁾ Доси досліджено, на скілько мені відомо, магнетні прикмети 69 елементів; між ними є 35 діямагнетними тілами, 31 парамагнетними, 4 ферромагнетними.

²⁾ Гл. *Rapports présentés au congrès internationale de physique. Tome II. Paris 1900. H. Du Bois. Propriétés magnétiques de la matière pondérable* р. 461.

Примітка. Редакція Збірника полишає термінологію і номенклатуру автора.

Ред.

товчок до поставлення проблеми на загальній основі дав Faraday¹⁾ у половині XIX віка. Він перший поставив тезу, що магнетизм се загальна прикмета матерії. Звісні його основні спроби зі штабкою із заліза і з візмуту. Перша уставляє ся у сильнім магнетнім поліу рівнобіжно до ліній сил, а друга нормально. Відповідно до поведення тіл у магнетнім поліу ділить Faraday всі тіла на парамагнетні, що поводять ся так, як залізо, і на діамагнетні, яких магнетні прикмети нагадують візмут. Після Faraday-а роблено дуже багато дослідів і то у різних напрямках. Однак загальний успіх їх був слабкий мимо накопичення материялу так, що вони мало причинили ся до прояснення проблеми, а навіть протинно замотували його. Доперва новіші часи принесли рішучий зворот. Систематичні і докладні досліди Pierre-a Curie-a з кінця XIX. віка стали вихідною точкою модерних магнетних дослідів і дали основу новим магнетним теоріям Langevin-a і Weiss-a, що при помочи теорії електронів розв'язують в цілости магнетний проблем відповідно до теперішнього стану науки.

Поділ тіл на згадані три класи виступає ясно, коли придивимо ся ближше їх магнетній вразливості (Suszeptibilität, Erregbarkeit) κ . Сим виразом називаємо відношене степеня намагнетизованя I тіла до магнетизуючої сили (сили магнетного поля H). Отже $\kappa = \frac{I}{H}$.²⁾ І так магнетна вразливість κ парамагнет-

них і діамагнетних тіл є взагалі сталою величиною і від сили поля H незалежною; однак κ перших є додатне, а других від'ємне. За те инакше є у ферромагнетних тіл. Хоч поверховно нагадують вони парамагнетні тіла н. пр. тим, що у одних і других виступають однакові бігуни у магнетнім поліу, то однак заходить між ними велика ріжниця, а саме магнетна вразливість κ ферромагнетних тіл не є сталою величиною, лише є функцією сили поля H , залежить від магнетних ціль, що передше ділали на дане тіло, і досягає високої

¹⁾ Wüllner. Experimentalphysik. III. Bd. 1897. p. 1120 і слідуючі.

²⁾ Для яснійшого розуміння пригаду, що степень намагнетизованя є магнетним моментом одиниці об'єму. Коли магнетний момент рівномірно намагнетизованого тіла є $\mathcal{M}$, а його об'єм V , то $I = \frac{\mathcal{M}}{V}$; магнетний момент се добуток із сили бігуна і віддалення обох бігунів. Коли-ж тіло нерівномірно намагнетизоване, то беремо елемент об'єму, якого довгота $= d\lambda$ і рівнобіжна до магнетної осі, і називаємо скількість магнетизму, що вкриває одиницю кінцевих поверхнь ds елементарного об'єму, знаком I . Тоді є магнетний момент сего елементарного об'єму $I ds d\lambda = I dv$. Положим $I ds = m$, отже магнетний момент елементарного об'єму є $m d\lambda$, а степень намагнетизованя $I = \frac{m d\lambda}{dv}$. Сила магнетного поля H є се механічна сила, з якою ділає поле на одиничний магнетний бігун.

вартості¹⁾. Тут також виступає у великій степені явище гістерези, відкрите найперше Warburg-ом²⁾, а коерцитивна сила значна. При тім всім χ завжди додатне. Дальше треба згадати, що магнетна вразливість парамагнетних і діамгнетних тіл дуже слаба. Н. пр. χ плинного кисня виносить після дослідів Kamerlingh-a Onnes-a і Albert-a Perrier-a³⁾ при температурі -208.2°C кругло $+284.10^{-6}$ одиниць C. G. S., при звичайній температурі (20°) є після P. Curie-a⁴⁾ χ кисня $= +0.14.10^{-6}$, а магнетна вразливість води рівна $-0.75.10^{-6}$ при 18°C .⁵⁾ Менше більше того самого ряду величини є вразливості інших парамагнетних і діамгнетних тіл. За те н. пр. питома магнетна вразливість заліза χ себто відношене магнетної вразливості χ до густоти D , отже $\frac{\chi}{D}$ досягає в полях нижших від 10.000 C. G. S. при темпер. 18°C вартість 236.⁶⁾

На перший погляд здається, що є три групи від себе зовсім відокремлені. Однак вже Faraday показав, що залізо при вишій температурі стає слабо магнетне. Те саме можна сказати про всі ферромагнетні тіла. Взагалі стають вони у вишій температурі парамагнетними, як се дослідив Curie⁷⁾. Кожде з них має питому собі температуру т. зв. температуру трансформації, при якій перемінює ся у парамагнетну відміну. Так то вже сама температура розсуває стіну поміж парамагнетними і ферромагнетними тілами. За те зміна температури не захитала окремого становища діамгнетних тіл. Однак можна всі групи зближити до себе при помочи хемічних перемін, як вказують на се хочби досліді Pascal-a⁸⁾.

Досліді над впливом температури на магнетні прикмети тіл вело багато фізиків. Перед роботами Curie-a замітні у сім напрямі досліді Plücker a, Wiedemann-a і Hopkinson-a. Plücker⁹⁾

1) Лише манган має розмірно малу вразливість, однак квалітативно має ферромагнетні прикмети (Гл. Fr. Heusler u. E. Take. Phys. Zs. XIII, 1912, S. 897).

2) Warburg. Wied. Ann. Bd. XIII, p. 141; Freiburger Berichte VIII, 8. Dezember 1880; Congrès internat. de phys. 1900. Paris. II. p. 509.

3) Kamerlingh Onnes and Albert Perrier. Communications. Leiden. 116. 1910. p. 33.

4) P. Curie. Oeuvres. Paris. 1908. Propriétés magn. des corps. p. 326. (У Curie-a подана питома вразливість χ , а $\chi = \frac{z}{D}$; D = густота).

5) Du Bois. Congrès internat. 1900. II. p. 504.

6) Du Bois. Ibid. p. 465.

7) P. Curie. Oeuvres p. 329.

8) Pascal. Annales de chim. et de phys. VIII. série XVI. Paris 1909. p. 571.

9) Wiedemann. Elektrizitätslehre. p. 1016 (Curie. Oeuvres. p. 234).

досліджував вплив температури на діямагнетні тіла. З дослідів, які він проводив над стеариною, сіркою, ртуттю і візмутом, виходить, що діямагнетизм перших трох тіл мимо підвищування температури не змінює ся, за те діямагнетна вразливість візмуту маліє, коли ogrівати його. Wiedemann¹⁾ досліджував вплив температури на парамагнетні соли і зробив замітне відкритє, що магнетна вразливість їх меншає wraz з підвищуванєм температури; при тїм є термічний співчинник магнетної вразливости однаковий для всіх ним досліджуваних парамагнетних солий. Після Wiedemann-a є він майже такий сам, як термічний співчинник розширення обєму газів, і виносить 0.00323 між 15° а 80° C. Відповідно до сего подав він $\kappa_t = \kappa_0 (1 - \alpha t)$, де κ_0 є магнетна вразливість при 0°, κ_t магнетна вразливість при t° , а α термічний співчинник. Plessner²⁾ потвердив дослїди Wiedemann-a і найшов $\alpha = 0.00355$ між 15° а 60° C. Замітні також праці Hopkinson-a³⁾, що досліджував прикмети ферромагнетних тіл аж до температури трансформації. Дослїди сих, як і инших фізиків, що працювали перед Curie і підчас його діяльности, мають багато недостач. Передовсїм вони несистематичні, по другє магнетні поля, які уживано, були розмірно слабї, а також границї температури не надто широкї. І так в. пр. робив Hopkinson свої дослїди найбільше до 770° C, а силу поля змінював в межах від 2 до 40 одиниць (C. G. S.). В наслідок сих і инших недостач годї було до недавна поставити загальну теорію магнетизму, що не лише змогла би описати поодинокї магнетні явища, але також подавала би звязь між магнетними прикметами всіх тіл. Сї причини спонукали Р. Curie⁴⁾ взяти ся до систематичного дослїду магнетних прикмет тіл при можливо ріжних умовах температури, тисненя і сили магнетного поля. Межі температури посунав він до 1375°, а силу поля змінював в межах від 25 до 1350 одиниць C. G. S. Крім того досліджував він також перебіг трансформації ферромагнетних тіл.

Дослїди Curie-a посунули справу значно вперєд і уможливили поставленє нових магнетних теорій, що обняли магнетні явища у загальний спосїб. Зараз по нїм являють ся праці Weiss-a і товаришів, що подають матерїял, обильний в дослїди над магнетизмом кристалів і над ферромагнетними тілами. При тїм посунули ся межї

¹⁾ Wiedemann. Elektrizitätslehre. p. 960. Poggend. Annal. CXXVI, 1865, p. 1.

²⁾ Plessner. Wied. Annal. XXXIX, 1890, p. 336.

³⁾ Hopkinson, Phil. Trans. 1889. p. 443 (зелїзо). — Proceed. R. S. XLIV, 1888, p. 317. (нікель). — Proceed. R. S. 1889, 1890. (Curie. Oeuvres. p. 235).

⁴⁾ Curie. Oeuvres. p. 233, 235.

поля до 50.000 Гавсів, а границі температури пішли далеко в гору і в долину. В останніх роках помітні також з одної сторони праці Pасca-а, що подають докладні досліді над магнетизмом багатьох елементів і хемічних сполук таї старають ся прояснити звязь між магнетними прикметами тіл і їх хемічним складом, з другої сторони досліді магнетних прикмет тіл, переведені під проводом Kamerlingh а Onnes а при дуже низьких температурах.

2. Діамагнетні тіла.

Досліді діамагнетної вразливости тіл сполучені з великими трудностями тому, що вона дуже слаба, а найменші занеачищення можуть легко закрити правдиву величину її. І так н. пр. вистане міліонова частина примішки зеліа, щоби закрити діамагнетні прикмети візмуту в полю 100 Гавсів¹). Тому не диво, що поміри в багатьох случаях недокладні, а деколи годі було рішити, чи тіло діамагнетне чи парамагнетне. Задля тої причини мусить ся уважати на те, щоби досліджуване тіло було хемічно чисте.

Загальні висліді праць над діамагнетними тілами дадуть ся представити в отсей спосіб. Доси не повело ся ще ніколи сконстатувати, щоби магнетна вразливість діамагнетних хемічно однородних тіл змінила свій знак під впливом самої лише зміни поля, температури або густоти. Противно, як якийсь елемент є діамагнетний, годі щонебудь висновувати із сего про магнетні прикмети його сполук. Н. пр. мідь є діамагнетною, а багато сполук її є парамагнетними²). Так само із діамагнетних сполук годі виводити діамагнетизм якогось елементу. Також не найдено ріжницї між питомою вразливістю розпущених і ціпких діамагнетних субстанцій. Вплив сили поля на діамагнетну вразливість дуже слабкий; тому весів Curie в межах від 50 до 1350 Гавсів лише з малими виймаками сконстатувати, що $I = f(H)$ є прямою лінійю. Також ствердив Curie, що діамагнетна вразливість не залежить від температури. Що найбільше можна сказати, що термічний співчинник магнетної вразливости дуже малий, а саме є він того самого ряду, що термічний співчинник розширення ціпких тіл.

Зміни хемічного і фізикального стану діамагнетних тіл впливають лише дуже слабо на діамагнетні прикмети. Мабуть останні

¹) Pascal. Recherches magnétochimiques. Ann. Chim. Phys. VIII, série. t. XIX. 1910. p. 9.

²) Du Bois. Congrès. internat. physique. II. 1900. p. 493.

залежать лише від найдрібніших частинок матерії. Н. пр. перехід у плинний стан не впливає зовсім на дімагнетну вразливість потасової салітри (точка таяння 350°), білого фосфору (т. таяння 44°), йоду (т. т. 104°), сірки (т. т. 110°); те саме бачимо у сірки при переміні її у всілякі аллотропічні відміни. Впрочім сей закон несповнений у всіх тіл докладно; у багатьох тіл сконстатовано більшу або меншу згідність із загальним правилом.

Виїмкове місце займають візмут і антимон; їх магнетна вразливість маліє дуже швидко, коли збільшаємо температуру. У візмуту відбуває ся переміна магнетної вразливости при огріванню після лінеарного закона. Також замітним є явище, що розтоплений візмут має магнетну вразливість 25 разів меншу, як цїпкий¹⁾.

По сїм загальнім перегляді придивім ся ближше деяким спеціальним случаям. Найперше возмім воду. Богато дослідників мірило її магнетну вразливість, а вислїди помірив не дуже відбігають від себе. І так н. пр. G. Quincke дістав 1885. р. $\kappa = -0.793.10^{-6}$, P. Curie 1895. р. $\kappa = -0.737.10^{-6}$, H. Du Bois 1888. р. $\kappa = -0.831.10^{-6}$, G. Jäger і St. Meyer 1899. р. $\kappa = -0.641.10^{-6}$. Середна вартість сих і инших помірив дає $\kappa = -0.753.10^{-6}$. Сї обчислення відносять ся до 18°C і до порожнї. Після них приймає du Bois питому вразливість води $\chi = -0.75.10^{-6}$. Однак з новіших дослідів виходить низша вартість вразливости води, а саме хитає ся вона докруги числа $0.73.10^{-6}$. Після найновіших помірив W. J. de Haas-a і P. Drapier-a²⁾, переведених в полї 40.000 Гавсів при 21° , виходить χ води $-0.747.10^{-6}$ супроти воздуха³⁾, а $-0.721.10^{-6}$ супроти водня. Сила поля не має ніякого впливу на вразливість води. Се доказано навіть для піль, що досягають 40.000 Гавсів. Так само незамітний вплив температури. Після Curie-a змінєє ся χ навіть не о 1.5% межі $+20^{\circ}\text{C}$ а $+189^{\circ}\text{C}$; инші дослідники нашли терромагнетні співчинники від -1 до -2 тисячні на 1° .⁴⁾

Curie робив поміри також над кристалічним кварцом. Вислїд їх був такий, що питома магнетна вразливість його показала ся у всіх напрамах однакова. Вартість її $\chi = -0.441.10^{-6}$. Під впливом висшої температури χ збільшає ся мабуть, однак се збільшенє так незначне, що в межах експериментальних похибок можна вважати χ незалежним від температури⁵⁾.

¹⁾ P. Curie. Oeuvres p. 328.

²⁾ W. J. de Haas u. P. Drapier, Ann. d. Phys. 42. 1913. p. 673.

³⁾ Для повітря $\kappa = 0.027.10^{-6}$ при 18°C . Гл. під 2).

⁴⁾ Du Bois. Congrès internation. p. 504, 505.

⁵⁾ Curie. Oeuvres. p. 261 і 262.

Також незміняє ся χ потасової салітри в межах від 18° до 420° . Се тим більше замітне, що потасова салітра топить ся при 350° . Отже ту маємо приклад на се, що зміна фізичного стану не впливає на діамagnetну вразливість. Величина єї є — $0.329 \cdot 10^{-6}$ при 18° .¹⁾ Так само не зауважав Curie замітних термомагнетних змін у теллюру, кухонної соли, потасового хлораку і сірчану в цїпкім станї, авї для фосфору, йоду і сірки в цїпкім і плиннім станї.

У антимону замітна велика зміна χ з температурою. Для звичайної відміни його виносить χ около — $1 \cdot 10^{-6}$; воно зменшає ся постійно з підвищенням температури; при 540° виносить воно $0.468 \cdot 10^{-6}$. χ другої відміни, одержаної електролітичною дорогою, значно менше. Цїлком відрубним є поведене візмуту. З підвищенням температури зміняє ся його магнетна вразливість χ після лінеарного закона, який Curie²⁾ подає в отсїй формі $10^6 \chi_t = 1.35 [1 - 0.00115(t - 20)]$, де t означає температуру. При 20° одержав Curie $\chi = -1.35 \cdot 10^{-6}$; подїбно находимо у Ettinghausen-a³⁾ $\chi = -1.37 \cdot 10^{-6}$. Після формулки Curie-a находимо для температури — 182°C $\chi = -1.68 \cdot 10^{-6}$, однак Fleming і Dewar⁴⁾ нашли при помочи помірїв для тої самої температури $\chi = -1.59 \cdot 10^{-6}$; видко закон лінеарної перемїни не відносить ся до так низьких температур⁴⁾. При точцї таяня (273°) є χ цїпкого візмуту рівне — $0.957 \cdot 10^{-6}$, а χ розтопленого візмуту стає 25 рази слабше і не зміняє ся між 273° а 408° ; його вартість є — $0.038 \cdot 10^{-6}$; сей наглий скок магнетної вразливости відбуває ся в інтервалї меншїм як 2° , при чїм не зауважано термомагнетної гістерези⁵⁾. Се замітне термомагнетне поведене візмуту ствердили вповнї у найновїйшїм часї K. Honda⁶⁾ і M. Owen⁷⁾.

Долучена фіг. 1. подає звязь між питомою магнетною вразливістю χ кількох діамagnetних тїл, а температурою в степенях Цельзія. На фігурї бачимо ясно характеристичні прикмети згаданих тїл. Вісь відрїзних обїймає температури, а вісь рядних подає вартости $\chi \cdot 10^6$. Фігура рисована після P. Curie-a.

Не від річи буде подати також дослїди Pascal-a, зроблені в останнїх лїтах. Вони подають обильний матерїял, дуже совїсно

¹⁾ Curie. Oeuvres. p. 261.

²⁾ Curie. Oeuvres. p. 269.

³⁾ Ettinghausen. Wied. Ann. XVII. p. 272.

⁴⁾ Du Bois. Congrès internat. p. 503.

⁵⁾ Curie. ibid. p. 270.

⁶⁾ Honda. Ann. d. Phys. 32, 1910, p. 1027.

⁷⁾ Owen. Ann. d. Phys. 37, 1912. p. 657.

опрацьований, з якого Pascal успів добути кілька інтересних законів, а також подати залежність магнетних прикмет тіл від їх хемічного складу. І так знаходить він, що атомова магнетна вразливість χ_a металюїдів, себто добуток із питомої магнетної вразливості і атомового тягару росте враз з атомовим тягарем. Се доказує він при помочи висновків із вислідів не лише своїх праць, але також праць Curie-а і Koenigsberger-а. Низше поданий перегляд вартостей — $10^7 \cdot \chi_a$, упорядкований після ростучих атомових тягарів і груп металюїдів.

I.	II.	III.
<i>Cl</i> 209.5	<i>S</i> 156	<i>P</i> 274
<i>Br</i> 319.2	<i>Se</i> 240	<i>Sb</i> 775
<i>I</i> 465	<i>Te</i> 389	<i>Bi</i> 1896.

Із сих вартостей виводить Pascal рівнянє $\chi_a = -10^{-7} \cdot e^{\alpha + \beta a}$, де a означає атомовий тягар, а α і β сталі величини, залежні від вартісности металюїдів. На α і β подає Pascal ось які вартости для поодиноких груп:

α	β
I. 2.195,	0.00380
II. 2.058,	0.00418
III. 2.2806,	0.00505

Перші елементи сих груп н. пр. F , N не підлягають експоненціальному закономі, а кисень є парамагнетний¹⁾.

Pascal досліджував також прикмети всіляких газів, головню зложених, і дійшов в суперечности до праць Quincke-а до вислїду, що вони є з виїмком кияня і азотавого окису (NO) діямагнетними тілами, котрих питома вразливість є ряду 10^{-6} . Однак Quincke оперував газами, що мали троха воздуха і найшов їх всіх парамагнетними. Вирочім вислїди його праць дуже непевні; ся непевність пояснює ся легко малою питомою вразливістю газів в умовах, в яких робить ся досвїди, а дальше тим, що мірянї магнетні сили газів дуже слабї. Тому Pascal скроплював гази; через те збільшав їх густоту 1000 рази, а вислїди ставали тоді певнійшими. На основї його праць, як і давнійших²⁾, можна припускати, що магнетна вразливість газів не залежить від температури і від тиснення при якім-небудь фізичнім станї їх. Сей здогад стверджує ся також сим, що

¹⁾ Pascal. Recherches magnétochimiques. Annal. Chim. Phys. VIII. série. t. XIX. p. 16—18.

²⁾ Du Bois. Congr. intern. p. 505.

спроможність скручування площі поляризації не змінює ся в хвилі скроплювання газів.

З дослідів над сими зложеними газами вивів Pascal зв'язь між молекулярною вразливістю їх χ_m (= добутком із питомої магн. вразливості і молекулярного тягару m) а числом атомів молекула n . Ся зв'язь є лінійна і має вид: $\chi_m = -23.3 \cdot (5 + n) \cdot 10^{-7}$; відси $\chi = -1.04 \cdot (5 + n) \cdot 10^{-10}$.¹⁾ Сі закони доказав Pascal для SO_2 , NH_3 , C_2N_2 , N_2O_3 , N_2O_4 .²⁾

Опісля найшов він аддитивний закон для діамagnetних елементів в органічних сполуках. Після того закона зберігають діамagnetні елементи свої магнетні прикмети у згаданих сполуках так, що можна обчислити їхнє χ_m із питомих вразливостей поодиноких елементів. Коли-ж крім діамagnetних елементів входить в органічну сполуку якийсь парамагнетний н. пр. кисень, то він набуває особливих магнетних прикмет, які зберігає незмінно у всіх аналогічно збудованих сполуках, а деколи стає навіть діамagnetним. Се правило дасть ся виразити формулою:

$$\chi_m = \sum \alpha \chi_A + \lambda, \text{ де } \chi_A, \chi_B, \chi_C, \dots$$

є атомовими магн. вразливістями елементів $A, B, C \dots$, введеними прямо з дослідів на діамagnetними тілами або одержаними посередно для ксеню. Стала λ залежить від структури молекула і рівнає ся зеру для сполук з нормальними вязаннями. Подібні дослідї вів вже Henrichsen³⁾; він найшов також для деяких тіл товщєвого ряду $\chi_m = \sum \alpha \chi_A$. α є число атомів того самого первня у хемічній сполучі.

Міряючи молекулярну магнетну вразливість богатїох насичених сполук товщєвого ряду і примінюючи аддитивний закон, обчислив Pascal атомову магнетну вразливість кількох елементів, при яких заходили доси неясности. І так найшов для водня $\chi_a = -31 \cdot 10^{-7}$, для вугля $\chi_a = -62.5 \cdot 10^{-7}$ (згідно із своїми експериментальними помірами⁴⁾), для азоту $\chi_a = -58 \cdot 10^{-7}$. Одно з таких обчислень наводимо за Pascal-ем. Коли н. пр. приглянемо ся гомольотичному рядови насичених товщєвих сполук, то побачимо, що два безпосередно по собі слідуєчі члени ряду ріжняють ся від себе о родень CH_2 . Сему родневи відповідає приріст молекулярної магнетної враз-

¹⁾ Бо $\chi_m = \chi \cdot m = \frac{\chi}{D} \cdot m = \chi \cdot \frac{m}{D}$, де D є густота, а $\frac{m}{D} = 22.412 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$ при 0° і нормальнім тисненню.

²⁾ Pascal. Ann. chim. phys. VIII. série, t. XIX, 1010. p. 18—23.

³⁾ Henrichsen. Wiedem. Annal. XXXIV. 1888. p. 180.

⁴⁾ Зближені вартости одержано для χ_a вугля, спрепарованого з цукру в лабораторії Bossha. Гл. М. Owen. Ann. d. Phys. 37, 1912. p. 657.

ливості все о таку саму величину, а саме о — $123 \cdot 5 \cdot 10^{-7}$, як се подає Pascal¹⁾, беручи середню вартість. Впрочім се річ не нова. Подібне спостереження зробили давнійше А. Wleügel і Р. Henrichsen²⁾, котрі також доказали, що молекулярна вразливість метамерних і ізомерних сполук однакова. Н. пр. вартості $\chi_m \cdot 10^{-7}$ є:

для C_6H_{14}	796	Ріжниця
C_8H_{18}	1037	$2 \times 120 \cdot 5$
$C_{10}H_{22}$	1297	2×130 ; так само
для CH_3OH	228	
C_2H_5OH	357	129
C_3H_7OH	479	122
$C_8H_{17}OH$	1092	$5 \times 122 \cdot 6$

Як сказано, є середня вартість $\chi_{CH_2} = 123 \cdot 5 \cdot 10^{-7}$, а відси $\chi_C = \chi_{CH_2} - \chi_{H_2} = \chi_{CH_2} - 2\chi_H = -10^{-7}$. $(123 \cdot 5 - 61) = -10^{-7} \cdot 62 \cdot 5$. Атомову магн. вразливість водня, обчислену на основі аддитивного закону Pascal-ем, ствердили вповні Kammerlingh Onnes і Perrier³⁾, що робили поміри над плинним воднем. Вони нашли $\chi_H = -27 \cdot 10^{-7}$; отже ріжниця є дуже незамітна.

Про ролю сталої λ у рівнянню $\chi_m = \sum a \chi_A + \lambda$ довідаємо ся, беручи під увагу ароматичні сполуки. Коли би ми н. пр. обчисляли χ_m бензолу, додаючи $6\chi_C + 6\chi_H$, то вийшло би — $558 \cdot 10^{-7}$; однак експеримент дає χ_m бензолу = — $574 \cdot 10^{-7}$. Те саме одержимо для інших сполук, що виводять ся з бензолу. Отже бензолеве ядро відповідає як раз сталій λ , яка виносить для нього — $15 \cdot 10^{-7}$. Подібну прикмету бачимо і в сполуках нафталіни, для котрої $\lambda = -63 \cdot 3 \cdot 10^{-7}$ і т. и. Із тих всіх дослідів потягнув Pascal висновок, що комплікація замкнених ланцюхів органічних сполук збільшає значно діаманетизм їх молекул⁴⁾.

Інтересні також досліді Pascal а над киснем, а зглядно над магнетними прикметами його у хемічних сполуках. Як звісно, кисень є досить сильно магнетним. Його атомова вразливість виносить поверх $+15 \cdot 000 \cdot 10^{-7}$. Однак він тратить майже зовсім свої магнетні прикмети у сполуках, а навіть може деколи поводити ся, як дія-

¹⁾ Pascal. Ann. chim. phys. ibid. p. 28 і слідуючі.

²⁾ A. Wleügel u. P. Henrichsen. Wied. Ann. XXII. 1884. p. 121; XXXIV. 1888. p. 180; XLV, 1892. p. 38. (Гл. Du Bois. Congrès internat. p. 505).

³⁾ Kammerlingh Onnes und A. Perrier. Communications from phys. lab. Leiden nr. 122, p. 10. (Гл. також Pascal. Ann. chim. phys. IX. série, 25, 1912. p. 289).

⁴⁾ Pascal. Ann. chim. phys. VIII. série. t. XIX. 1910. p. 31—35.

магнетний елемент. Се найшов Pascal¹⁾, студіюючи металічні кисневі родні, а відтак при дослідах над органічними сполуками. В останнім разі показало ся, що великий вплив на магнетні прикмети кисня має положене його серед других атомів хемічної сполуки. І так н. пр. у насичених алькоголів (CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ і т. д.) є атомова вразливість кисня $X'_0 = -48 \cdot 10^{-7}$, у товщевих насичених альдегідів (CH_3CHO , $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ і т. д.) є кисень злегка парамагнетним; його $X''_0 = +17 \cdot 25 \cdot 10^{-7}$; подібно у кетонів є $\chi''_0 = +18 \cdot 10^{-7}$. За те у товщевих квасів (HCOOH , CH_3COOH , і т. д.) є кисень знов діамагнетним; його $\chi_{\text{O}_2} = -83 \cdot 10^{-7}$ (для обох киснів разом, що находять ся в молекулі останніх сполук). Сі числа найшов Pascal, примінюючи аддитивний закон. Відтак займав ся він органічними сполуками із сіркою і азотом та деказав, що оба сі елементи задержують свої діамагнетні прикмети в сполуках, і то перший в цілости, а другий улягає лише злегка впливови структури молекула²⁾).

У своїй новійшій праці³⁾ справджує Pascal свої давніші вислуди і на основі нового багатого експериментального матеріялу досліджує звязь між структурою молекула а магнетними прикметами. Між иншим доказує він вплив многократних вязань на питому магнетну вразливість, що обявляє ся деколи в значнім обниженю діамагнетизму. Н. пр. присутність одного етиленічного вязаня обнижує χ о $57 \cdot 10^{-7}$, а для подвійного вязаня $\text{C}=\text{N}$ оксимв, гідрозинів і азометивів є $\lambda = +85 \cdot 10^{-7}$. Противний вплив має перстенева структура. Вона заведи підвищує діамагнетну вразливість. Се підвищенє виносить н. пр. для кожного атому вугля в бензолу — $2 \cdot 5 \cdot 10^{-7}$, разом для цілого ядра — $15 \cdot 10^{-7}$, подібно для більше скомплікованих сполук.

Дальші дослуди Pascal-а мають інтерес радше для хеміків, а загальний висновок з них редукує ся до отних слів. Магнето-хемічна аналіза, розважно ужита, може віддати добру прислугу у вишукуваню молекулярної структури хемічних сполук так само, як і инші фізикально-хемічні методи; заразом не є виключеним, що вона достарчить колись ужиточних інформацій про структуру атомів і про суть вартісности елементів.

¹⁾ Pascal. Ann. chim. phys. VIII. série t. XVI. p. 567; t. XIX. 1910. p. 36. і прочі.

²⁾ Pascal. Ann. Chim. Phys. VIII. série. t. XIX. 1910. p. 57 і 58.

³⁾ Pascal. Ann. Chim. Phys. IX. série. t. 25. 1912. p. 289.

3. Парамагнетні тіла.

Досліди магнетних прикмет парамагнетних тіл є доволі тяжкі іза того, що парамагнетна вразливість, подібно як і діямагнетна, є дуже невелика. Тому найдрібніші примішки ферромагнетного металю можуть зробити поміри зовсім ілюзоричними. Коли н. пр. χ якогось парамагнетного тіла вносить 10^{-6} , а ми умістимо його у магнетнім полю, якого сила рівна 5.000 C. G. S., то питомий степеь намагнетизована¹⁾ досягне вартости $+0.005$ C. G. S., рівночасно виносити ме питомий степеь намагнетизованя зелізних занечищень кругло 250 C. G. S., т. є. 50.000 рази більше. Отже вистарчить $\frac{1}{5000}\%$ занечищень із зеліза, щоби закрити зовсім парамагнетні явища. Те саме відносить ся також до діямагнетних тіл, як се згадано вище²⁾. Тому не дивно, що праці ріжних дослідників давали не раз незгідні, а часом і противні висліди, а доперва новішими чачами по приміненю докладніших метод одержано певніші. Дуже багато дослідів роблено над парамагнетними солями, і то безводними, скристалізованими і розпущеними.

З поміж праць давніших фізиків заслугують на увагу праці G. Wiedemann-a³⁾. Передовсім сконстатував він аддитивний закон для парамагнетних розчинів, а саме найшов, що магнетизм сільного розчину рівний сумі магнетизмів розчинника тай розпущеної соли. Відси рівняне $\chi = \chi' g' + \chi'' (1 - g')$, де χ' відповідає соли, χ'' розчинникови, а χ розчинови. Коли χ' і χ'' мають протевні знаки, то можна в сім разі так зложити розчин, що $\chi = 0$, а $\chi' = \frac{g' - 1}{g'} \cdot \chi''$.

Такі немагнетні розчини є добрим і певним засобом для магнетних дослідів над розпущеними солями тим більше, що магнетна вразливість парамагнетних розчинів не залежить від сили поля, а немагнетні розчини остають такими і в полю, якого сила досягає 40.000 C. G. S. Згаданий закон ствердили du Bois і O. Liebknecht⁴⁾, а висліди помірів, на основі його роблених, покривають ся вповні з вислідами, які інші фізики одержали другими методами.

¹⁾ Питомий степеь намагнетизованя (S) се є магнетний момент одиниці маси. Коли маса тіла є M , то $S = \frac{M}{M}$, а що в случаю рівномірного намагнетизованя є степеь намагнетизованя $I = \frac{M}{V}$ (гл. стр. 2), то означуючи густоту знаком D , маємо:

$$S = \frac{M}{V \cdot D} = \frac{I}{D}$$

²⁾ Du Bois. Congrès internat. phys. p, 483.

³⁾ Wiedemann. Pogg. Ann. CXXVI. p. 8, 1865. Du Bois. Congrès intern. phys. p. 484. 485.

⁴⁾ Du Bois u. O. Liebknecht. Ann. d. Phys. 1, 1900. p. 178.

Магнетна вразливість солей є також незалежна від природи розчинника, бодай в першому зближенні¹⁾. Дальше доказав Wiedemann, що питома магнетна вразливість цінких кристалічних солей в загальї така сама, як розпущених солей; є лише небогато виїмків. Противно безводні цінкі соли мають низшу вразливість.

Замітні також досліди над відношенем парамагнетної вразливості до сили магнетного поля. Для багатьох тіл найшли Wiedemann²⁾, Schuhmeister³⁾ і Eaton⁴⁾, що парамагнетна вразливість не залежить від поля, а відтак Н. du Bois⁵⁾ дійшов до висновку, що ступень намагнетизованя I всіх простійше зложених течій, розпущених солей і газів є пропорціональний з силою поля H . Той сам вислід одержав також Curie⁶⁾. Належить ще додати, що до подібного вислїду прийшли у новішій часі Honda⁷⁾ і Owen⁸⁾. З їх дослідів над магнетною вразливістю пара- і діаманетних елементів виходить, що вона здебільша незалежна від поля, а залежність її від поля у прочих елементів можна пояснити примісками ферромагнетних тіл н. пр. заліза. Також замітним є, що Owen в нїоднім случаю не найшов гістерези (магнетного припізнєня). Сим, що парамагнетні тіла мають вразливість, незалежну від сили поля, нагадують вони діаманетні субстанції. Однак заходить між ними крім противного знаку також ся значна ріжниця, що зміна температури має на парамагнетну вразливість значний вплив тоді, як діаманетна взагалі незалежна від температури. А саме найшов Curie⁶⁾, що вона відворотно пропорціональна до абсолютної температури. Ся звязь виражає ся рівнанєм $\chi = \frac{C}{T}$, де C є сталою величиною, залежною від природи даного тіла. Н. пр. для кисня найшов Curie: $10^6 \cdot \chi = \frac{33.700}{T}$ поміж 20° а 450° . Сей закон відповідає в першій приближеню заковові лінеарної переміни питомої магнетної вразливості парамагнетних солей, який відкрив Wiedemann, а ствердив Plessner⁹⁾. Заразом найшли оба останні вчені,

¹⁾ Du Bois. Congrès intern. ibid.

²⁾ G. Wiedemann. Poggend. Ann. CXXVI. p. 8.

³⁾ Schuhmeister. Wiener Berichte. LXXXIII.

⁴⁾ Eaton. Wied. Ann. XV. d. 225.

⁵⁾ Du Bois. Wied. Ann. XXXV. p. 187.

⁶⁾ Curie. Oeuvres p. 328.

⁷⁾ Honda. Ann. d. Phys. 32, 1910. p. 1027.

⁸⁾ Owen. Ann. d. Phys. 37, 1912. p. 657.

⁹⁾ Порівн. Wiedem. Elektrizitätslehre. III. S. 960; Plessner ibid.; Plessner. Wied. Ann. 39. p. 336. 1890.

що термічний співчинник парамагнетних солей α майже такий самий, як термічний співчинник розширення газів. Закон Wiedemann'a має вид: $\chi_t = \chi_0 (1 - \alpha t)$, де χ_t вразливість при температурі t , а χ_0 при 0° . Відси виходить приблизно $\frac{1}{\chi_t} \cdot \frac{d\chi_t}{dt} = -\frac{1}{T}$, а дальше $\chi_t = \frac{C}{T}$.¹⁾ Curie дійшов до сего закону, піддаючи новій рахубі вартости, знайдені Wiedemann-ом і Plessner-ом. Опісля зробив він сам магнетні поміри над залізовим сірчаном, розпущеним у воді (5·35%-ий розчин) і найшов докладне ствердження гіперболічного закону, як се подають низше наведені числа:

t	$10^6 \cdot \chi$	T	$\chi T \cdot 10^6$
+ 12° C	85·8 C. G. S.	285° абс.	24500 C. G. S.
+ 46° "	75·6 "	319° "	24100 "
+ 108° "	63·2 "	381° "	24100 "

Також провів Curie сей закон для ціпких безводних солей, висушених через ogrіванє до 250°, взявши під розвагу поміри Plessner-a²⁾. Однак сконстатував, що заходять також неточности, як н. пр. для сірчану ніклю. І для инших тіл повело ся Curie-ви³⁾ доказати закон відвортної пропорциональности температура, при чім поклав він в основу свої поміри. Крім того годить ся згадати ще про поміри Fleming-a і Dewar-a, зроблені над спорешкованими кристалами манганавого сірчану у плиннім воздуху. Вони найшли також гіперболічний закон, як се бачимо з отсх чисел:

t		- 182° C,	+ 25° (степ. Celsi-a)
T		91° C,	298° (абс. темп.)
χ		349,	105 (довільн. одиниць)
$T\chi$		31800,	31300 (" ")

Після імени виваходчика названо сей закон законом Curie-a, а добуток $\chi \cdot T = C$ сталою Curie-a⁴⁾.

Графічне представленє закону Curie-a буде найуспішнїйше тоді, коли, пішовши за прикладом Curie-a, зьогартмуємо рівнанє $\chi = \frac{C}{T}$ і одержанє рівнанє $\log \chi = \log C - \log T$ зобразимо на рисунку. Тоді дістанемо для парамагнетних тіл самі прямі лїнії,

¹⁾ Curie. Oeuvres, p. 281.

²⁾ Curie. ibid. p. 285.

³⁾ Curie. Oeuvres p. 327.

⁴⁾ Du Bois. Congrès internat. II. p. 486.

як се бачимо на фіг. 2, де $\log \chi$ є на осі рядних, а $\log T$ на осі відірзних. Тангента кута нахлоненя сих прямих є -1 , отже вони до себе рівнобіжні.

Однак новіші досліди показують, що закон Curie-а не опановує всіх парамагнетних тіл. Особливо замітним є, що парамагнетні елементи лише в малій мірі годять ся з законом Curie-а. Honda¹⁾ успів доказати його лише для палляду, згідно з помірами Curie-а²⁾, а Owen³⁾ лише для елементів: *Ce*, *Nd*, *Pr*, *Er*. При дуже низьких температурах наступають збочення від закону відвортної температури також у парамагнетних тіл, що при звичайній температурі зовсім точно годять ся з ним. Н. пр. кисень, що у інтервалі кілька сот степенів поводить ся згідно із згаданим законом, при дуже низькій температурі (у плиннім стані), не підходить під нього; за те відносить ся тоді до нього рівнане $\chi_m \sqrt{T} = A$, де A є сталою величиною, як се виходить з помірів Kamerlingh-а Onnes-а і Perrier-а⁴⁾. При найнищих температурах, які можна досягнути, а саме при температурі цїпкого водня зближає ся χ кисня до сталої вартости. Під проводом Kamerlingh-а Onnes-а⁵⁾ переведено в останніх двох роках в лабораторії в Leiden цілий ряд студий над парамагнетними субстанціями при дуже низькій температурі і на основі їх можна більшу часть сих тіл звести до отсих трех типів: I. До першого типу належать тіла, для яких закон $\chi T = C$ важний аж до температури плинного кисня; при ще низьких температурах маліє добуток χT . Сюди належать н. пр. кристалічний *FeSO₄*, кристалічний *MnSO₄*. II. У инших субстанцій починає χT маліти, як лише температура спаде низше комнатної температури (н. пр. у безводного *MnSO₄*), в сїм разі відносить ся мабуть до них рівнане $\chi(T + \Delta) = \text{const.}$, де Δ є сталою величиною. Важність сего рівнання сягає лиш від звичайної температури до температури плинного азоту; при ще низькій температурі являють ся нові збочення. III. У платини і деяких инших тіл змінє ся вразливість χ лише мало що з температурою, однак в інтервалі між температурою плинного азоту і плинного водня χ майже незалежне від температури.

Перейшовши загальні прикмети парамагнетних тіл, пригляньмо ся кільком замітнішим случаям. Найперше возьмім на увагу кисень, котрого магнетні прикмети ми вже в части обговорили. Пи-

¹⁾ Honda. Ann. d. Phys. 32, 1910, s. 1027.

²⁾ Curie. Oeuvres p. 286.

³⁾ Owen. Ann. d. Phys. 37, 1912, p. 657.

⁴⁾ Kamerlingh Onnes a. A. Perier. Commun. phys. lab. Leiden Nr. 116.

⁵⁾ E. Oosterhuis. Com. Suppl. Nr. 31 to Nr. 133—144, 1913.

тому вразливість його мірено нераз, а вартости її годять ся добре що до ряду величини зі собою, коли відносять ся до тої самої температури. І так найшов Н. du Bois 1888 р. при 15°C і при тисненню 1 атмосфери $\chi = 88 \cdot 10^{-6}$ (відносно до порожні), G. Quincke 1888. р. для 16°C при тисненню від 1 до 8 атмосфер $\chi = 92 \cdot 10^{-6}$, а при тисненню 40 атм. $\chi = 118 \cdot 10^{-6}$, P. Curie 1892 р. для 20° при 18 атм. $\chi = 115 \cdot 10^{-6}$, R. Hennig 1893. р. для 25° при 1–4 атм. $\chi = 93 \cdot 10^{-6}$, Fleming і Dewar 1898. р. для плинного кисня при -182° $\chi = 285 \cdot 10^{-6}$. Коли зведемо при помочи закону Curie-а наведені вартости магнетної вразливости на абсолютну температуру 291° , одержимо вартости, що хитають ся між $87 \cdot 10^{-6}$ і $117 \cdot 10^{-6}$, отже досить згідні висліди, як взяти на увагу трудність помірив. Інтересними є також досліди над впливом тиснення на магнетну вразливість кисня. Всі дослідники годять ся, що магнетна вразливість χ при сталій температурі пропорціональна до тиснення. З того виходить, що пятама вразливість χ не залежить від тиснення, що ствердив також Curie. Як сполучимо закон $\chi = \frac{C}{T}$ із законом

Boyle-а і Mariotte-а, одержимо рівняне: $\chi = \frac{BP}{T^2}$, де B є сталою величиною, а P тисненем. Останнє рівняне годить ся вповні з дослідями, як се вже сказано¹⁾.

З вартостей найдених для кисня і зі складу повітря можна легко обчислити обговорювані величини для повітря. Коли приймемо, що χ азоту можна понехати (воно дуже мале), а при тім знаємо, що температура не має впливу на магнетні прикмети азоту, дістанемо для повітря:

$$\chi = \frac{0.2310 C}{T}, \quad \kappa = \frac{0.2094 B P}{T^2};$$

при тім прийнято, що повітря має 0.2310 кисня в одиниці маси, а 0.2094 в одиниці обему. Вартости C і B треба взяти від кисня.

Curie вивів в згоді з сими висновками для повітря $10^6 \cdot \chi_t = \frac{7830}{T}$, а відтак експериментом найшов для 24°C : $10^6 \chi_{24} = 26.6$, а з формулки виходить 26.3. Отже справджене сих виводів є достаточне.

З прочих газів є лише азотавий окис $N_2 O_2$ парамагнетним, що доказано частійше, а саме виходить се з помірив Quincke-а, Ефимова, Toepler-а і Hennig-а, прочі всі доси досліджувані

¹⁾ Du Bois. Congrès internat. phys. p. 487–490; Curie. Oeuvres. p. 272–278.

гази є діямагнетні, як се недавно доказав Pascal. Його молекулярна вразливість виносить всего $\frac{1}{3}$ молекулярної вразливості газового кисня при тих самих внішніх умовах¹⁾.

Інтересні є досліді над металами. Між ними найліпше пізнано магнетні прикмети ферромагнетних металів, котрі будуть обговорені окремо, і прикмети міді, що є в звичайній температурі діямагнетною. Однак як перші, так і послідна дають багато парамагнетних сполук. Про вплив температури на парамагнетні соли вже була мова. Тому треба лише згадати інші характеристичні прикмети їх. А саме найшов G. Wiedemann²⁾, що молекулярна вразливість розпущених солий катіона означеної вартісности не залежить від природи аніона. Отже н. пр. χ_m всіх залізавих солий є однакове. Сей закон ствердив Quincke³⁾, що уживав при помірах иншої методи, як Wiedemann. Опісля доказали Liebknecht і Wills⁴⁾ те саме майже загально для 36 розчинів солий. Для прикладу наводимо числа з помірів їх над солями заліза і міді:

Назва соли	χ_m	$C. m^5)$
Fe I ₂	0·01282	3·74
Fe S O ₄	0·01272	3·70
Fe (N H ₄) ₂ (S O ₄) ₂	0·01263	3·69
Fe Cl ₃	0 01353	3·95
Fe Br ₃	0·01482	4·32
Fe ₂ (S O ₄) ₃	0·01515	4·41
Fe (N H ₄) (S O ₄) ₂	0·01510	4·40
Fe (N H ₄) (C ₂ O ₄) ₂	0·01533	4·46
Fe (N O ₃) ₃	0 01352	3·94
Cu Cl ₂	0·00165	0·48
Cu Br ₂	0·00157	0·46
Cu S O ₄	0·00164	0·48
Cu (N O ₃) ₂	0·00163	0·48

Однак не для всіх металів є сей закон сповнений, н. пр. у солий заліза є значні збоченя, за те у міді, мангану, ніклю, хрому, кобальту замітна незвичайна згідність з наведеним законом.

¹⁾ Du Bois. Congrès internation. p. 492; Wüllner. Experimentalphysik. 1897. III. p. 1145; Pascal. Ann. Chim. Phys. VIII. série, t. XIX, p. 18.

²⁾ Du Bois. Congrès intern. p. 495; Wiedem. Elektrizitätslehre. 2. Auflage. III. Bd. § 1270—1289; Wüllner. III. p. 1143.

³⁾ Quincke, Wied. Ann. XXIV. p. 347. XXXIV. p. 403. Wüllner. ibid. p. 1143.

⁴⁾ Du Bois. Congrès internat. phys. II. p. 495. Ann. Phys. I. p. 178, 1900.

⁵⁾ C = стала Curie-а, m = молекулярний тягар.

Колиж метал є в аніоні н. пр. в хромані, манганані, залізані, то магнетні прикмети його цілковито змінюють ся, а навіть можуть перейти у діамagnetизм. Се спостережене, зроблене ще Wiedemann-ом¹⁾, стверджено опісля; в недавнім часі одержав те саме Pascal²⁾ і розширив на більше скомпліковані сполуки, доказуючи, що метал, входячи у скомплікований йон або в коллоїд, затрачує у новій сполуці часть або і всі магнетні прикмети, які має у нормальних солях.

Магнетизм розчинів солей заліза, кобальту, ніккю, хрому і мангану досліджував недавно також Paul Drapier³⁾. Після нього є розчини лише тоді парамагнетні, коли металі є в них свободними йонами; колиж йони скомпліковані н. пр. у розчині ціанової соли (Blutlaugensalz), або у коллоїдальній формі, то розчини є слабо парамагнетні або і зовсім ні. Розчини, у яких молекули не улягають диссоціації н. пр. Fe_2Cl_6 в етері, не є магнетні.

Вкінці важним є питане, чи є яка зв'язь між діамagnetними і парамагнетними тілами. Се питане рішено у додатний спосіб. А саме сконстатовано, що діамagnetні елементи можуть давати парамагнетні сполуки (н. пр. Cu Br_2 , Cu Cl_2) і противно парамагнетні елементи дають нераз діамagnetні сполуки (н. пр. Mg O , Al_2O_3)⁴⁾. Видко у хемічних сполуках виступають взаїмні ділання атомів на себе так сильно, що магнетний характер змінє ся. При сій нагоді добре згадати, що подібні взаємини між парамагнетними і ферромагнетними тілами сконстатовано в багатьох случаях⁵⁾.

4. Ферромагнетні тіла.

В тісній зв'язи із парамагнетними тілами стоять ферромагнетні. Одні і другі мають магнетну вразливість однакового знаку; в одних і других змінє ся вона сильно під впливом температури. Не те бачимо у діамagnetних субстанцій; їх вразливість взагалі незалежна від температури, а се вказувало би на те, що суть діамagnetизму лежить у внутрі молекула. Крім того треба замітити, що перехід із ферромагнетного стану у парамагнетний розмірно легкий; вистарчить лише підвишити температуру до певного характеристичного

¹⁾ Du Bois. Congrès internat. p. 498.

²⁾ Pascal. Ann. Chim. Phys. 1909. 8. série. XVI. p. 531; Journ. Phys. 7, 1908, p. 921.

³⁾ P. Drapier. Journ. chim. phys. 7, p. 385. 1909.

⁴⁾ Meyer. Ann. d. Phys. 1, 1900, p. 668; Koenigsberger. Wied. Ann. 66, 1898, p. 698; Ann. d. Phys. 1, 1900, p. 175.

⁵⁾ Honda. Phys. ZS. 11, 1910, p. 1079.

ступеня. Протилежно зміню температура не переводить діаманетних прикмет у манетні; тут треба радикальнійшого чинника, яким є хемічні впливи.

Однак є також великі різниці між параманетним і ферроманетними тілами. По перше ферроманетна вразливість змінює ся враз з силою поля, по друге намаганетизоване залежить не лише від манетних сил, що в даній хвилі ділають, але також від сил, що передше ділали. Вкінці замінним є також особливий вплив температури на перебіг намаганетизованя ферроманетних тіл.

Коли сила поля росте від зєра в гору, то степен намаганетизованя є зразу пропоруціональний до намаганетизованя; отже манетна вразливість κ є сталою величиною. Опісля росте намаганетизоване повільнійше, як сила, і зближає ся до максимум: до т. зв. манетного насичєня. Типовим прикладом сего є перстєнь або безконєчно довгий тонєнький циліндер із чистого мягкого зєліза. У нього є для сили поля $H < 1$ C. G. S. вразливість κ рівна околє 30 одиницям. Опісля росте κ враз із силою поля і осягає максимум для степеня намаганетизованя I , що виносить звиш 400. Вкінці для $H > 10$ починєє I рости щєраз повільнійше і зближає ся до насичєня¹⁾. Для прикладу подаємо вартости намаганетизованя I кількох ферроманетних тіл при насичєню для температури 18°.

	Fe	Co	Ni
I	1850,	1370,	580,
$\frac{I}{\delta} = S$	236,	158,	65.

Дальшою характеристикою ферроманетизму є манетне припізнєнє або т. зв. гістєреза. Суть сего явища, відкритого вперше Warburg-ом²⁾, полягає в тім, що при зменшуваню сили поля тій самій силі відпєвдає сильнійше намаганетизованє, як при збільшуваню; отже силє зєро відпєвдати мє якийсь додатний степен намаганетизованя, т. зв. манетний останєк (Remanenz), який можна усунути, уживаючи певної від'ємної манетної сили поля т. зв. коєрцитивної сили. Крім сєї гістєрези пізнаємо ще инші роди. Н. пр. гістєреза виступає також при обєртаню ферроманетного тіла в однєроднім полю (поміж бігунами сильного електроманета), а також при огріваню і остуджуваню ферроманетних тіл. Над сим вєдєно дуже богато інтерєсних дослєдів, а літературу сего предмету до 1900. р. подав сам Warburg³⁾.

¹⁾ Du Bois. Congrès internat. p. 464—467.

²⁾ Warburg. Wied. Ann. Bd. XIII. S. 141.

³⁾ Warburg. Congrès internat. de phys. 1900. II. L'hystérésis p. 509.

Найдовше годить ся спинити на впливі температури на криву намагнетизованя ферромагнетних тіл. Сей вплив прояснив у великій мірі Р. Curie¹⁾. Досліджуючи залежність питомого намагнетизованя від сили поля при різних степенях температури, найшов він для м'якого заліза, що вище 756° питома магнетна вразливість його χ не залежить від сили поля; се обсервував він для пільмежи 25 і 1300 C. G. S. одиниць. Отже вище 756° став залізо парамагнетне; воно трансформує ся. Щоби краще подати сю залежність від температури, зображує її Curie при помочи логаритмічних співрядних. І так на осі відірзних подає він логаритми абсолютної температури, а на осі рядних логаритми питомої вразливості χ . Зображені в той спосіб криві $L\chi = f(LT)$ мають особливий вигляд, як се бачимо на фіг. 2. Curie подає на сій фігурі кілька кривих. Три горішні відносять ся до заліза, дві другі до інших ферромагнетних тіл, а долішні прямі до парамагнетних тіл; останнє є очевидним, коли пригадаємо собі, що для парамагнетних тіл $\chi = \frac{C}{T}$, а $L\chi = LC - LT$ є рівнянням прямої із співчинником напрямку $tga = -1$.

Пригляньмо ся кривим заліза, що відповідають полям різної сили. Вони сходять ся із собою вище 750° . Опісля біжить одна крива, спільна різним полям, однак перебіг її не однаковий; як бачимо з фігури, складає ся вона із 4 частин, відділених від себе точками *b*, *c*, *d*, *e*. Curie пояснює сей нерівномірний перебіг кривої тим, що залізо переходить при висших температурах у аллотропічні відміни. І так при температурі 756° переходить залізо із звичайного стану т. зв. області α у стан β . Стан β зображений на фігурі кривою *ac* і лежить поміж 756° а 920° . Він є перехідовий поміж ферромагнетним а парамагнетним. Серед нього подибуємо дві відміни, відділені точкою *b*, що відповідає температурі 860° . У першій мале магнетна вразливість враз з температурою після гіперболічного закону, у другій ся переміна відбуває ся трохи скорше. В стані γ поміж 920° і 1280° є χ відворотно пропорціональне до абсолютної температури; залізо є тоді парамагнетне; відповідно до того є на фігурі часть кривої *cd* прямою, рівнобіжною до других парамагнетних прямих. При 1280° зростає χ нагло о $\frac{2}{3}$ своєї вартости, а поміж 1280° а 1366° (границя дослідів Curie-а) одержуємо пряму *ef*, що є мабуть продовженням кривої *ab*. Коли би крива бігла від *a* до *f* у нормальний спосіб так, як поміж *a* і *b*, то

²⁾ Curie. Oeuvres. p. 306. і далші.

ми одержали би криву, що докладно відповідала би кривим нижчих ферромагнетних тіл, як н. пр. ніклю і магнетиту¹⁾.

Curie робив також дослідн над білим чагуном (литим залізом), що не був надто чистий, бо містив в собі крім вугля фосфор, сїрку і аршеник, а крім того над ніклем і магнетитом. Для першого найшов він температуру трансформації близько 670°. Другої трансформації нема, а таяне чагуна не має мабуть жадного впливу на степень намагнетизованя його. Між 850° а 1267° можна представити вислїди при помочи прямої, що біжить рівнобіжно до парамагнетних прямих. Для сеї прямої $\epsilon 10^6 \chi = \frac{38500}{T}$. — Температура трансформації ніклю лежить після Curie-а близько 340°, а поміж 373° а 806° є магнетна вразливість його незалежна від поля. Температура магнетної трансформації магнетиту ($Fe_3 O_4$) лежить близько 535°, а магнетна вразливість його не залежить від поля в межах від 550° до 1370°. При температурах, вищих від 850°, має магнетит парамагнетні прикмети, його вразливість є тоді відворотно пропорціональна до температури і дасть ся представити рівнянєм $\chi \cdot 10^6 = \frac{2800}{T}$.²⁾

Дослїди над сими кількома ферромагнетними тілами вказують на те, що вони всі трансформують ся при певній температурі у парамагнетні тіла, а тоді магнетна вразливість стає незалежна від поля, бодай для досліджуваних піль (нижше 1350 одиниць). Однак магнетна вразливість їх ще досить велика, коли порівнаємо їх з парамагнетними тілами. Із зростом температури маліє χ , а навіть стає величиною того самого ряду, що χ парамагнетних тіл. Замітною річю є, що пряма кїсня, яка зображає звязь між χ і T у логаритмічній видї, продовжена накриває ся з прямою м'якого заліза між 925° а 1280°. Колиж приймемо, що закон переміни кїсня поміж 15° а 450° важний і для вищих температур, то зможемо зробити висновок, що питома магнетна вразливість заліза і кїсня однакова поміж 925° а 1280°. Гіперболічний закон температури опановує ферромагнетні тіла при високих температурах; отже він є мабуть граничним законом, до якого прямує закон переміни питомої магнетної вразливости кожного ферромагнетного тіла, коли підвищимо температуру достаточнo понад температуру трансформації³⁾.

¹⁾ Curie. Oeuvres p. 316 і 317.

²⁾ Curie. Oeuvres. p. 321 і д.

³⁾ Curie. Oeuvres p. 330.

Магнетну вразливість м'якого заліза при низких температурах досліджували Fleming і Dewar¹⁾. Вони нашли лише слабе обниження її при температурі плинного воздуха; те саме було також при температурі плинного водня. З другої сторони доказано, що χ ферромагнетних тіл в загалі збільшає ся при ogrіваню; часом се збільшане поступає безмежно, особливо близько самої магнетної трансформації. Тоді саме дів ся се нагло і тому можна в сей спосіб точнійше спрецизувати температуру трансформації. Після того подали її Osmond, Lydall і Pocklington²⁾: 320°C для ніклю, около 1100°C для кобальту і 870° для чистого заліза. Занечищена обнижають сю температуру значно і спричиняють нераз значну термомагнетну гістерезу. Після найновіших дослідів вважає Weiss³⁾ точками Curie-а: 774° для електролітичного заліза, 1110° для кобальту, 364° для ніклю, 581° для магнетиту і 319° для піротину.

Обговоривши загальні прикмети ферромагнетних тіл, добре буде згадати також про анальгію, яку замітив Р. Curie⁴⁾ між зміною їх магнетних прикмет під впливом температури і сили поля а зміною густоти газів під впливом температури і тиснення. Ся анальгія о стілько важна, що дала почин до нової теорії ферромагнетних тіл, теорії Weiss-а. Щоби її зрозуміти, пригляньмо ся функціям $F(S, H, T) = 0$ і $\Phi(D, p, T) = 0$; перша відносить ся до магнетного тіла, друга до газів, при чім S є питомим степенем намагнетизованя, D густотою газу, а p тисненем. У сій анальгії відповідає S густоті D , а H тисненю p . Для ферромагнетних тіл висше температури трансформації і для парамагнетних є $S = C \cdot \frac{H}{T}$,

де C є сталою величиною⁵⁾. Так само є для газів високо поверх критичної температури $D = \frac{1}{R} \cdot \frac{p}{T}$, де R є сталою величиною. Законом Mariotte-а і Gay Lussac-а відповідає закон незмінности магнетної вразливости підчас зміни сили поля і закон відверненої абсолютної температури.

Порівнаймо ближше перемену степеня намагнетизованя під впливом температури в сусідстві температури трансформації при рівночасно незміннім полю з анальгічним явищем у газів; тоді по-

¹⁾ Du Bois. Congrès internat. p. 467.

²⁾ Du Bois. Congrès internat. phys. p. 467.

³⁾ Weiss et Foëx. Journ. de phys. 1, 1911, p. 744.

⁴⁾ Curie. Oeuvres p. 330.

⁵⁾ Бо $\chi = \frac{S}{H}$, а також $\chi = \frac{C}{T}$; отже $S = C \cdot \frac{H}{T}$.

бачимо, що зовсім подібно перебігують густота останніх під впливом температури у сусідстві критичної температури, коли тиснене полишимо сталє. Сю аналогію перебігу обох функцій $S = \Psi(T)$ і $D = \Psi_1(T)$ видимо добре на фігурах 3. і 4. Перша зображує криві однакового тиснення, сконструювані Amagat-ом для двокису вугля, друга криві заліза для різних піль, нарисовані Curie-м. Густота двокису вугля брана відносно до води. Крива переходу двокису вугля у плинний стан зазначена на фігурі точками.

Приглянувши ся перебігови обох систем кривих, зауважуємо, що криві $S = \Psi(T)$ заліза для обсервованих піль 50, 100, 300, 1000, 1300 одиниць є поміж 740° а 760° похожі на криві двокису вугля $D = \Psi_1(T)$ поміж 0° а 258° для тиснення поміж 75 а 200 атмосфер. Коли температура обнижає ся, криві $S = \Psi(T)$ зближають ся поміж 750° а 740° , а понизше 740° віддаляють ся від себе. А у газів зауважано, що криві $D = \Psi_1(T)$ зближають ся постійно, коли температура обнижає ся. Між тим для води (досвідч Amagat-a) криві зближають ся до себе між 200° а 45° , а відтак віддаляють ся від себе поміж 45° а 0° .

Се порівнянє о стілько хосенне, що насуває на думку нові досвідч. Н. пр. густота газу збільшає ся враз з обниженєм температури тим нагальнійше, чим тисненє низше. Коли тисненє слабше, як критичне, то наступає нагла контракція і переміна в теч. Так само степєнь намагнетизованя збільшає ся враз з обниженєм температури тим нагльйше, чим слабша сила поля. Отже можна собі поставити питанє, чи се збільшенє намагнетизованя не відбувати меть ся нагло при достаточнє слабій силї поля. Можна би дальше досліджувати, чи існує критична точка і критичні сталі для магнетних явищ і т. д.

Із загальної точки погляду можна думати, що магнетні трансформації н. пр. заліза при 756° є привязані до означеної температури для кожного магнетного тіла, подібно як наглі контракції газів відбувають ся при означених температурах.

Вкінци зі становища молекулярної теорії можна би сказати подібно, як для газів, що нагле збільшенє степєня намагнетизованя наступає як-раз тоді, як степєнь намагнетизованя магнетних частиць є достаточнє сильний, щоби вони могли на себе взаїмнє реагувати. Однак, навівши сї аналогії, остерігає Curie, щоби не приписувати їм надто великого значіння. Бо сї аналогії не можна строго перевести. І так н. пр. ізотерми $S = g(H)$ і $D = g_1(p)$ не дуже подобають на себе.

В останнім десятиліттю звернули на себе увагу також магнето-кристалічні досліди над ферромагнетними тілами, а крім того магнетні прикмети стопів, поміж якими подибуємо часто ферромагнетні явища. Магнето-кристалічні явища досліджував вперше Poisson ще 1823 р., опісля займалися ними Faraday, Plücker, Tyndall, Knoblauch, Grailich, Lang, W. Thomson, Stenger, Koenig, Koenigsberger, Lehman¹⁾. Особливі прикмети магнетних кристалів відносять ся до всіх трьох груп магнетних субстанцій. Полягають вони в тім, що намагнетизоване здовж різних осей кристалів в всілякої величини, деколи заходять навіть ріжниці що до ряду величини.

Поміж магнетними кристалами заслугують головно на увагу ферромагнетні; деякі з них мають досить правильні магнетні прикмети. А тому, що ферромагнетні тіла, як н. пр. залізо, не є ізотропними тілами, лише зложені із дуже дрібоньких кристалів, можна припускати, що ближше пізнане прикмет ферромагнетних кристалів причинить ся до розуміння ферромагнетних явищ. Ферромагнетних тіл, що мають виразні кристалічні прикмети, є лише два: кристалічний магнетит (Fe_3O_4) і піротин (сірчак заліза неозначеного ближше складу). Дуже докладні досліди над прикметами їх перевів Р. Weiss. Найперше провадив він досліди над магнетитом²⁾. Сей мінерал кристалізує в правильнім укладі, а поведене його у магнетнім полі зовсім відмінне від поведення ізотропних тіл. Його ступень намагнетизованя має взагалі инший напрям, як напрям сили поля, а також величина його змінє ся із зміною напряму поля. Здовж головних осей сконстатував Weiss в полі 150 C. G. S. намагнетизованя, що відносять ся до себе, як 15:18:19. В головній осі є намагнетизоване найменше; найвища його вартість $I = 435$.

Далеко інтересніші є магнетні прикмети піротину. Weiss³⁾ досліджував кристали піротину ріжного походження і відповідно до поведення їх у магнетнім полі ділить їх на нормальні і аномальні. Перші походять з Morro Velho в Бразилії. Вони показують в супротивности до других велику правильність під магнетним зглядом. Кристали їх на перший погляд належать до гексагонального укладу. Степень намагнетизованя шестигранної призми з піротину може для всіх напрямів в основі прибрати значну величину; за те є намагне-

¹⁾ Du Bois. Congrès internat. p. 506; Wüllner. Experimentalphysik. III. 1897. S. 1146.

²⁾ P. Weiss. Journ. de phys. 3-e série t. VII. 1899. p. 542; Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellsch. 1905. S. 325.

³⁾ Weiss. Journ. de phys. IV. série. t. 4. 1905. p. 469.; Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellsch. loco citato.

тизоване нормально до сеї площі майже рівне зеро. Сю визначну площу, що містить завсїди в собі вектор намагнетизованя, зове Weiss магнетною площею. Коли поле наклонене до сеї площі, то напрям і величина намагнетизованя у магнетній площі відповідає складовій поля у сій площі.

Відповідно до сих прикмет магнет притягає піротивну кулю, коли вона завішена на нитці так, що її магнетна площа є рівнобіжна до лній сил. Як вона нормальна до них, то притягане не наступить.

Перші дослїди над магнетною площею піротиву дали зразу дуже замотаний вислїд. Однак Weiss-ови повело ся із сего на перший погляд замотаного вислїду витягнути дуже важні висновки, що відразу кидаютъ ясне свѣтло на прикмети піротиву. І так найшов він, що кристал піротиву складає ся з трех простїйших кристалів, явх магнетні площі накривають ся і лише є скручені зглядом себе о 120° . Сі три кристали осягають взагалі ріжний степенъ намагнетизованя; деколи виступають головню магнетні прикмети одного кристалу, а магнетні прикмети обох других майже не виступають. З останного рода кристалів випровадив Weiss прикмети простого нормального кристалу. Вони дадутъ ся зібрати в отсих кількох словах: У магнетній площі простого кристалу є два характеристичні напрями, до себе нормальні, у яких сила поля і намагнетизоване мають той сам напрям. Оден із сих напрямів є напрямом легкого намагнетизованя, а другий напрямом тяжкого намагнетизованя. У першім напрямі вистарчають вже слабї поля, щоби довести степенъ намагнетизованя до насиченя. У нормальнім напрямі до першого субстанція поводить ся так, неначе би против намагнетизованя ділало якесь сильне відмагнетизовуюче поле, якого причину треба глядати у кристалічній структурі. Сила сего поля виносить 7300 Гавсів. Коли поле має довільний напрям і довільну величину, то степенъ намагнетизованя має инший напрям, а величина його залежно від напрямку ріжна. Коли на фіг. 5. OA представляє напрям легкого намагнетизованя, а OC тяжкого, то підчас обороту поля довкруги точки O одержимо ось що. Тоді як вектор поля описує площу фігури, почавши від OA до OE , вектор намагнетизованя описує дугу AB лучем, що відповідає насиченю; коли-ж вектор поля зближає ся у своїм обороті до OC , тоді вектор намагнетизованя, що доси оставав позаду першого, описує в одній хвилі тативу BD рівнобіжну до напрямку легкого намагнетизованя, щоби опісля описувати дугу насиченя DE . Однак для піль више 7300 Гавсів описує вектор намагнетизованя повне коло насиченя.

Уживаючи піль величини кількох сот Гавсів, не зауважав Weiss намагнетизованя піротину нормально до магнетної площі. Але як поле досягнуло величини кількох тисячів одиниць, показалося слабе намагнетизоване піротину нормально до магнетної площі. Магнетна вразливість χ виносила в сїм напрямі $314 \cdot 10^{-6}$.

Коли піротин завдячує свої магнетні прикмети у сїм напрямі залізови, яке містить в собі, то, узглядиючи густоту його в піротині ($= 1.76$), дістанемо питому магнетну вразливість сего заліза $\chi = 175 \cdot 10^{-6}$, а атомову $\chi_a = a \chi = 56 \chi = 0.0098$. Це число годить ся з атомовою вразливістю заліза, виведеною на основі помірів du Bois над парамагнетними солями; остання рівнає ся 0.0074^1). З того виходить: „Атомсва вразливість заліза в піротині у напрямі нормальнім до магнетної площі є рівна атомовій вразливості заліза у парамагнетних солях“. Отже бачимо, що піротин ферромагнетний у магнетній площі, а парамагнетний в напрямі нормальнім до неї.

Не таку правильність бачимо в аномальнім піротині. Його прикмети нагадують лише дуже загально прикмети нормальних кристалів. І так н. пр. нема у них так замітної різниці між магнетною площею а иншими напрямими. Н. пр. Weiss найшов для трех різних аномальних кристалів для слабих піль у напрямі нормальнім до магнетної площі намагнетизоване, що виносило $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{17}$ і $\frac{1}{42}$ намагнетизованя у сїй площі. Для піль тої самої величини годі навіть найти слід намагнетизованя у згаданім напрямі нормального кристалу; воно виносить для нього і в найсильїйших полях $\frac{3}{850}$ рівнобіжного намагнетизованя²). У магнетній площі аномального кристалу подибуємо ті самі групи кристалів, що в нормальнім кристалі. І з них випровадив Weiss прикмети простого кристалу. Важна заходить різниця обох родів піротину також в напрямі тяжкого намагнетизованя; коли для нормального є відношене складової поля H_D до складової намагнетизованя $I \sin \varphi$ у сїм напрямі завжди сталою величиною так, що $\frac{H_D}{I \sin \varphi} = \frac{7300}{47}$ (порівн. фіг. 6.), то для аномальних кристалів не має сей закон жадного значіння.

Досліди над гістерезею в піротині показують також велику різницю обох родів. В нормальних кристалах є гістереза розмірно невелика, в аномальних значна. Однак годі на сїм місці розводити ся довше над тям явищем.

¹) Weiss. Journ. de phys. 1905 p. 829.

²) Du Bois. Congrès internat. 1900. p. 494—496.

³) Weiss. Journ. de phys. 1905 p. 504.

Придивім ся тепер впливови температури на магнетизм піротину. Його досліджували Weiss і Kunz¹⁾. Передовсім найшли вони, що різниці між прикметами обох родів піротину ростуть wraz з підвищенням температури. Н. пр. крива намагнетизованя нормального піротину $I = \varphi(t)$ виглядає наче відповідна крива заліза. При 319° лежить температура трансформації. Остуджуючи піротин одержуємо ту саму криву. Инакше є з кривою намагнетизованя аномального піротину; при кождоразовім ogrіваню і остуджуваню виходять ріжні криві $I = \varphi(t)$, що вказує на сильну термічну гістерезу. Зміна температури має також вплив на групу кристалів, із яких зложений кристал піротину. Однак в нормальнім кристалі угрупованє вертає ся по остудженю до давнього стану, а в аномальнім відбувають ся переміни степенів намагнетизованя поодиноких складових кристалів, що не вертають по остудженю ані до давних величин ані до первісного взаємного відношеня; також вплив часу є ту замітний.

Кінчаючи обговорювати ферромагнетні тіла, хочемо згадати кількома словами про стопи. Поміж ними є найбільше характеристичні сї, що повстали через стопленє слабомагнетних або навіть і діамагнетних металів. Їх відкрив Fr. Heusler²⁾ 1898. р. і від його імени загально називають їх Heusler-овими. Є се стопи мангану, що містять в собі крім мангану або мангану і міді ще один елемент н. пр. Al, Sn, As, Sb, Bi, B . Найсильнійше ферромагнетні є стопи, зложені із Al, Mn, Cu . Хоч для глину $\kappa = +1.88.10^{-6}$, для міді $\kappa = -0.82.10^{-6}$, а для мангану що найбільше $\kappa = +100.10^{-6}$, то помимо того стопи із сих трех металів мають магнетну вразливість ряду заліза; н. пр. магнетна вразливість їх доходить при насиченю до $\frac{3}{4}$ вразливости литого заліза³⁾. Температура трансформації ріжних Heusler-ових стопів є ріжна. Вона лежить, почавши від 350° в долину. Також повело ся доказати явище гістерези у сих стопах⁴⁾.

Ферромагнетизм їх приписує Heusler хемічній сполуді складових металів; після нього носителем ферромагнетних прикмет мангано-глинового бронзу є молекул складу $Al_n(Mn Cu)_{3n}$. Література сих замітних стопів дуже велика, хоч відкрито їх недавно.

¹⁾ Weiss et Kunz. Journ. de phys. 4, 1905, p. 847.

²⁾ Richarz. Phys. Zeitschr. 1911. S. 151; Heusler u. Take. Phys. Zeitschr. 1912. S. 897.

³⁾ Fr. Heusler, W. Starck, E. Haupt. Verhandl. d. Deutsch. Phys. Gesellsch. 5, 1903, S. 219.

⁴⁾ Asteroth. Ibid. 10, 1908, S. 21.

При кінці сего розділу треба ще додати, що ферромагнетні метали можуть на відворот затрачувати свої прикмети у стопах і давати парамагнетні стопи, подібно, як се діє ся у солях н. пр. стопи заліза з ванадом, заліза з глином, нікелю з хромом, кобальту з хромом. В сім разі повстають мішані кристали з обох складових металів або хемічні сполуки¹⁾.

5. Langevin-ова теорія парамагнетизму і діямагнетизму.

До недавніх часів не було ні одної теорії магнетизму, що позволялаб обіймати всі магнетні явища в одноцільний спосіб. Кожда давніша теорія мала розмірно значні недостаті. І так стара теорія одного магнетного флюїда, себто вільної нетяжкої субстанції, що проникає тіла подібно як давній гіпотетичний флюїд теплоты, не могла довго остояти ся тому, що не годна була пояснити всіх магнетних явищ. Її наслідниця, теорія двох магнетних флюїдів, годить ся вправді з фактами, однак не може вдоволити тому, що властиво описує лише обсервовані факти, а всілякі нововідкриті магнетні прикмети приписує обом гіпотетичним флюїдам; за те на істноване обох флюїдів не дає жадного доказу. Відтак перенесено оба флюїди до поодиноких молекулів і намагнетизоване тіл приписувано упорядкованю напрямів молекулів; після сеї теорії молекули уставляють ся рівнобіжно до себе, звертаючись в оден бік полудневними бігунами, в яких є нагромаджений полуднево-магнетний флюїд, а північними бігунами з відповідним флюїдом у противний бік (Poisson). Спадкоємницею сеї молекулярної теорії є гіпотеза Ампер-а²⁾, що становить великий крок вперед. Ампер-ови³⁾ саме завдячуємо досліди над притяганем і відпиханем проводів, у яких пливе електрична струя, як також досліди над магнетними прикметами соленоїдів. Сі досліди спонукали його заступити молекулярні магнети елементарними електричними струями, що пливають у молекулах тіл, а площа їх є нормальна до осей давних молекулярних магнетиків. В немагнетнім стані є сі елементарні струї неупорядковані, а в магнетнім полі осей їх уставляють ся рівнобіжно

¹⁾ Honda. Phys. ZS. 11, 1910, p. 1079.

²⁾ Wüllner. Experimentalphysik. III 1897, p. 1009; Ampère. Ann. de chim. et de phys. XV. p. 70, 170.

³⁾ Wüllner. Experimentalphys. III. p. 924, 985, 988. Ampère. Ann. de chim. et de phys. XV, XX. Ampère. Mémoire sur la théorie de phénomènes électrodynamiques. p 266.

до напрямку поля. Ся теорія ґрунтує ся, розуміє ся, на факті, що колова струя ділає на віддаль так само, як магнет, котрого вісь рівнобіжна до осі струї, а момент M рівний добуткови із струї i і поверхні S , обмеженої проводом: ($M = i \cdot S$). Дальше висновує Ампер, що проводи, в яких кружать струї, не мають зовсім опору, бо инакше єї струї мусїли би перестати кружити.

Однак теорія Ампера не надає ся зовсім до виясненя діямагнетних явищ. Се спонукало W. Weber-a¹⁾ придумати для діямагнетних тіл окрему теорію. Він займав ся головнo візмутom і на основі дослідів над ним поставив гіпотезу, що його молекули не годні обертати ся і що в його молекулах є колові проводи без жадного опору. Колиж до візмуту або до иншого діямагнетного тіла зближимо магнет, то на згадані проводи починають ділати електромоторичні сили індукції. Вони збуджують індукційні струї, що кружити муть в сих проводах, хочби електромоторична сила щезла. Бо закон Ома не може відносити ся до сих проводів без опору. Ось так перемінати муть ся молекули діямагнетних тіл під впливом магнету у тревалі магнети, але так, що відповідно до правила Ленца будуть вони звернені до магнетового бігуна своїми рівноіменними бігунами; наслідок того є взаїмне відпиханє. Колиж віддалимо магнет від діямагнетного тіла, тоді збудить ся у елементарних проводах останнього знов електромоторична сила. Вона рієна електромоторичній силі, що повстає при зближаню магнету, але напрям її противний. Тому нищить вона попередні електричні струї у молекулярних проводах і тіло тратить свій діямагнетизм. З того виходить, що діямагнетизм ніколи не є тревалий, а се дійсно доказано.

Як бачимо, обі останні теорії, як Ампера, так Вебера, не дають одноцільного образу магнетних явищ. Передовсім ділить не-проходима безодня діямагнетні і магнетні тіла, а в теорії Ампера не слідно ріжницї між парамагнетними і ферромагнетними тілами. Дальше не говорять нам теорія Ампера-а нічого про причини повставаия елементарних струй ані про те, що піддержує їх. Максвелл²⁾ старав ся обі теорії сполучити, але не розв'язав проблему, не маючи достаточного знання будови молекулів.

Однак сегодня можна поставити магнетну теорію, що краще вдоволяє всі вимоги тому, що з одної сторони поспішила на поміч

¹⁾ Wüllner. Experimentalphysik. III. 1897, p. 1132.

²⁾ Langevin. Sur la théorie du magnétisme. Journal de Physique. IV. 1905. p. 678.

теорія електронів, з другої сторони пізнано докладнійше магнетні явища, як се було за часів Ampère-a і Weber-a. Сеї задачі підняло ся кількох дослідників, як Voigt, I. I. Thomson, Langevin. Перші оба не розв'язали проблему у вдовольний спосіб, а спеціально теорія Voigt-a зовсім не пояснює закону Curie-a, що відносить ся до парамагнетних тіл і до ферромагнетних при висшій температурі, ані не подає причин незалежності діамagnetизму від температури. За те повело ся Langevin-ови¹⁾ при помочи теорії електронів змодифікувати ідеї Ampère-a і Weber-a у відповідний спосіб, подати виразно пояснене діамagnetних і парамагнетних явищ і разом узглядити всі закони магнетних прикмет, як н. пр. закон Curie-a.

Після теорії електронів вважаємо матерію агломератом електричних центрів або електронів, що, порушаючи ся в етері, витворюють магнетне поле. Останнє є аналогічне з полем, яке витворює елемент електричної струї. Сила сего поля є пропорціональна до наряду електрона і швидкості його. На витворенє його зуживає ся енергія пропорціональна до квадрату швидкості електрона; ся енергія є рівноважна з енергією самоіндукції струї, а форма її така, як кінетичної енергії. Отже електрони мають наслідком свого наряду якусь певну безвладність і мабуть безвладність матерії є взагалі лише електромагнетного походження. Теорія електронів спромогла пояснити дуже багато явищ, а нові досліди скріпляли її основу щораз більше. Також особливости Zeeman-ового явища повело ся Lorentz-ови пояснити у знаменитий спосіб на тлі електронової теорії, а навіть предвидіти. Електромагнетні і світляні лучі завдячують свій початок електронам, що кружать у нутрі молекулів в замкнених проводах і дізнають прискорення. З періоди дрогання світла, що виносить около 10^{-15} секунд, висновуємо, що час обігу електронів τ у їх проводах є величиною такого самого ряду. Тези електронової теорії можна легко перенести на Ampère-ові елементарні струї. Найперше треба приписати причину сих струї електронам, що кружать у нутрі молекулів. Відтак легко доказати, як се зробив Langevin, що кружляючі електрони дають на віддаль такий самий магнетний момент $M = \frac{eS}{\tau}$, як струї, для яких $M = Si$ (e = наряд електрону). Инакше сказавши, провід, здовж якого порушає ся електрон, є рівноважний з проводом, у яким пливе струя

¹⁾ Langevin. Journal de Phys. ibidem. Annal. de chim. et de phys. VIII. série. 5. 1905. p. 70.

з нагугою $i = \frac{e}{\tau}$. Наведене рівняння можемо написати також у формі

$M = e \bar{A}$, де $\bar{A}$ є середньою поверхневою швидкістю. Кожний молекул містить після Langevin-a саме тільки елементарних струй, кілька в ній електронів. А що кожна елементарна струя має якийсь магнетний момент, то цілий молекул відповідає магнетови, якого момент рівний геометричній сумі магнетних моментів поодиноких елементарних струй. І тепер може наступити два случаи, або сей вислідний магнетний момент рівний зеру або різнять ся від зера. Се явище тісно звязане з внутрішньою структурою молекула. В першій случаю зносять ся взаємно магнетні ділання елементарних струй у вишнім просторі, хоч мимо того струї не перестають існувати; заразом не є виключене, що молекул може у молекулярнім віддаленю витворювати менше або більше скомпліковане електромагнетне поле.

Під впливом вишнього магнетного поля настає за всегди зміна в елементарних струях і то діамагнетна, зовсім так, як уявляв собі Weber. Однак діамагнетні прикмети, що є після сеї думки загальними прикметами матерії, виступають на зверх лише тоді, як вислідний магнетний момент молекула рівний зеру: тоді саме є матерія діамагнетною у звичайнім значіню того слова. Колиж вислідний магнетний момент різнять ся від зера, тоді прулучує ся до первісного магнетного явища ще й друге, а саме молекули, наче малі магнетики, звертатимуть ся своїми осями у напрям вишнього магнетного поля. Тоді тіло є парамагнетне або ферромагнетне залежно від того, чи взаємні ділання між молекулярними магнетами слабкі, як н. пр. у газів і розчинів, або сильні, як у деяких ціпких тіл; в останнім разі грають вони визначну ролю. Як являє ся парамагнетизм, то він все значно сильніший від первісного діамагнетизму і закриває його зовсім. І дійсно найдено експериментом, що парамагнетні сталі є взагалі більші у порівнянню з діамагнетними. Тому ясно, що так остро від себе відмежовані парамагнетні і діамагнетні тіла.

Огже всі тіла стають діамагнетними під впливом вишнього поля і при тім все одно, чи тіло впровадимо в магнетне поле, чи збудимо магнетне поле в просторі, у яким субстанція находить ся. Langevin доказав се¹⁾, а заразом обчислив зміну магнетного моменту під впливом вишнього магнетного поля. Вона виносить для одного електрону, що кружляє нормально до напрямю поля H :

¹⁾ Langevin. Ann. Chim. phys. VIII. série. 5, 1905. p. 87.

$\Delta M = -\frac{He^2 S}{4\pi m}$ ¹⁾, де m є маса електрону. Знак сего додаткового моменту протилежний до знаку зовнішнього поля, отже явище є діамagnetне і то без огляду на знак вислідного моменту молекула.

Діамagnetний момент є дуже маленькою величиною. Бачимо се з отсх висновків. З візріця на діамagnetний момент виходить, що діамagnetна вразливість одного електрону є $\kappa = \frac{e^2 S}{4\pi m}$. Коли-ж

на одиницю об'єму припадає N однакових електронів, то діамagnetна вразливість одиниці об'єму $\kappa' = \frac{Ne^2 S}{4\pi m} = \frac{\rho}{4} \left(\frac{e}{m}\right)^2 \frac{S}{\pi}$, де ρ є густота

електронів. У виразі κ' визначну роль грає відношене $\frac{e}{m}$, а що воно

для від'ємних електронів 1000 рази більше, як для додатних, то звідси виходить, що головна часть діамagnetної модифікації припадає на долю від'ємних електронів. — Тепер возьмім для простішого рахунку случай, що електрони кружать в колових орбітах.

Тоді $\kappa' = \frac{\rho}{4} \left(\frac{e}{m}\right)^2 r^2$. В случае води є $\kappa'_s = +0.8 \cdot 10^{-6}$; густота ρ від-

ємних електронів, з яких зложена лише часть молекула, є менша від 1, а мабуть значно більша від $\frac{1}{2000}$ ²⁾; $\frac{e}{m} = 1.8 \cdot 10^7$, як се зна-

не з численних обчислень. Тоді для луча орбіти r дістаємо: $10^{-10} < r < 4 \cdot 10^{-9}$. Сі числа годять ся з молекулярними розмірами. Прецінь знаємо, що луч молекула є трохи більший від 10^{-8} ; отже в молекулах можуть зовсім добре помістити ся орбіти електронів. Як бачимо, луч електронних орбіт дуже малий, тим самим діамagnetна модифікація є лише дуже незначна.

Впрочім докажемо се, порівнюючи діамagnetний приріст моменту ΔM з первісним моментом електрону M . Тому, що $M = \frac{e S}{\tau}$,

а $\Delta M = -\frac{He^2 S}{4\pi m}$, є $\frac{\Delta M}{M} = \frac{H \tau}{4\pi} \cdot \frac{e}{m} < 10^{-9} H$; се висовуємо відси,

що $\frac{e}{m} = 1.8 \cdot 10^7$ для від'ємних електронів, а для додатних ще менше,

а τ є величиною ряду 10^{-15} подібно як у світлі. Щоби $\frac{\Delta M}{M} = 1$,

¹⁾ Langevin. Journ. de phys. IV. 1905. p. 686.

²⁾ Густота електронів $\rho = Nm$; а що густота води = 1, то $\rho < 1$. Однак тому, що $m = \frac{1}{2000}$ атому водня, то $\rho > \frac{1}{2000}$.

мусіло би бути $H = 10^9$. Однак доси знані поля мають силу 10^5 в найліпшій формі; вони модифікують магнетний момент елементарної струї що найбільше о одну десятитисячну частку первісної вартості.

Подібно як магнетний момент елементарної струї, так само середня сила її $\frac{e}{\tau}$ змінюється мало що під час витворювання зовнішніх магнетних полів, які знаємо досі. Далше треба зазначити, що дуги орбіти, бодай в формі кола, не змінюються під впливом зовнішнього поля, коли приймемо, що електрон порушується під впливом центральної сили. Доказ на це перевів Langevin для колових орбіт¹⁾. За те змінюється лише період обігу τ в такій самій мірі, як сила струї $\frac{e}{\tau}$ і момент $\frac{eS}{\tau}$, т. зв. о $\frac{1}{10000}$ первісної вартості. Ця маленька зміна періоду відповідає докладно явищу Zeeman-а; відомо прецінь, що навіть дуже сильне магнетне поле модифікує лише слабо періоду дуги світла. Отже через збудження зовнішнього магнетного поля змінюється сила елементарних струй і то так, що період електронів, які порушуються в одному напрямі, росте, а період електронів протилежного напрямку маліє. Такі самі зміни спричиняють явище Zeeman-а. Незвичайно мала сила останнього стверджує невизначеність діамagnetної модифікації.

Крім того можна зробити висновок, що загальна основа Zeeman-ового ефекту доказує загальність діамagnetних явищ. Навіть в залізі, для якого доказано ефект Zeeman-а, нагромаджується під впливом зовнішнього поля діамagnetна зміна елементарних струй. Отже діамagnetизм є так само загальною прикметою матерії, як явище Zeeman-а, лише в багатьох случаях він закритий сильнішим парамагнетизмом.

Як вище сказано, не змінюються елементарні проводи своєї форми під впливом зовнішнього магнетного поля, а також сила їх струй майже не змінюється, як це виходить із слабкої якості діамagnetизму. Тому легко буде перейти до пояснення парамагнетизму, беручи під розвагу, що магнети складаються з подібних елементарних струй, і узгадуючи взаємні дії елементарних струй магнету на струї в даній тілї, які відбуваються після законів електродинаміки.

Як первісний магнетний момент молекула рівний нулю, то під час збудження зовнішнього поля не наступає жадне инше явище

¹⁾ Langevin. Ann. chim. phys. VIII. s. 5, 1905. p. 96—99; Journ. de phys. IV. 1905. p. 687.

крім діямагнетної модифікації, бо взаємні ударення між молекулами не уляжуть ніякій зміні. Внїшнє поле не буде мати впливу на рух молекулів і він буде відбувати ся так само, чи буде діямагнетна модифікація, чи ні. Коли-ж субстанція є в термічній рівновазі, то міжмолекулярні удари не змінюють зовсім середного розміщення електронів; отже розгін (*Bewegungsgroße*) електронів задержує ся в цілості серед сих ударів і для того діямагнетний момент не змінє ся ізза термічного руку молекулів. Тому, що чисто діямагнетна модифікація не змінє руху молекула як цілості, а той рух саме спричинює явища теплоти, то відси виходить, що діямагнетна модифікація не заколючує термічної рівноваги. Отже температура зовсім не змінить ся в наслідок появи її. Навідворот середмолекулярні рухи електронів дуже мало залежать від температури, як видко се із спектральних дослідів¹⁾. Відси маємо висновок, що діямагнетна стала змінє ся дуже мало з температурою і є майже незмінна, як се найшов Р. Curie у своїх дослідях. Однак теорія діямагнетних тіл не була би повна, коли би поминуло ся особливіші примети візмуту. Як знаємо, маліє його діямагнетна стала із піднесенем температури після лінеарного закона. I. I. Thomson²⁾ поясняє сей виїмок, приймаючи, що у візмуті, як впрочім і у других металах, є крім середмолекулярних електронів ще і багато інших, що порушують ся свобідно поміж молекулами; ці свобідні електрони дають металам спроможність проводження, а під впливом внїшнього магнетного поля скривлюють ся їх дороги у діямагнетнім змислі. Підвисшенє температури може впливати на скорість тих свобідних електронів, на їх дороги і на їх число. А тому що у візмуті ці дороги дуже довгі, то там пояснює ся його відмінне поведене.

Приходимо тепер до другого случаю. Вислідний магнетний момент молекулів не є рівний зеру. Під впливом внїшнього магнетного поля наступить також тепер діямагнетна модифікація, як впрочім в кождім тілі. Однак крім того старає ся внїшнє поле уставити магнетні осі молекулів рівнобіжно до напруму поля. Через те змінє ся рух молекулів як цілостий; кінетична енергія одних молекулів більшає, других меншає. Сі молекули, яких осі рівнобіжні до поля, мати муть більшу кінетичну енергію, як виші. Т. зв. термічна рівновага буде заколючена. Однак в наслідок взаїмних межимолекулярних ударів в случаю газу або розчину варівнає ся температура, а молекулярні магнети звернуть ся переважно у напрямі

¹⁾ Langevin Journ. de phys. 689. IV., 1905.

²⁾ I. I. Thomson. Rapp. du Congrès internat. T. III. 1900. p. 148.

внїшнього поля. Тодї саме виступить парамагнетне явище. З причини нового розміщення молекулів підвищить ся також температура коштом роботи, виконаної внїшнім полем. Ся робота спричинює приріст моменту dM , отже величина її є $dW = H dM$. Щоби температуру даного тіла в найпростїйшїм случаю, отже в случаю газу, удержати у первїсній висотї, треба забрати йому теплоту, рївноважну із сею роботою:

$$dQ = H dM = H \left(\frac{\partial M}{\partial H} dH + \frac{\partial M}{\partial T} dT \right).$$

Тому, що $\frac{dQ}{dT}$ є повною рїзничкою, виходить $M = f\left(\frac{H}{T}\right)$, а в случаю, коли намагнетизоване пропорціональне до сили поля, одержимо $M = k \cdot \frac{H}{T}$. Останнє рївнанє є якраз законом Curie-а, який найшов він експериментальною дорогою.

Термодинаміка не дає способів на се, щоби найти форму функції f . Однак Langevin поміг собі, дошукуючи ся аналогїю між поведенем молекулярних магнетів у магнетнім полі і поведенем молекулів якогось газу у полі гравітації. В сїй цілі бере він під розвагу якусь газову масу, замкнену у резервуарі, на яку не ділає тяготна сила. В такїй газовій масі буде розміщене молекулів рївномірне, густота газу буде всюди однакова. Подібно буде з розміщенням осей молекулярних магнетів, коли газ є поза магнетнім полем; вони будуть звернені у всїх можливих напрямках і то рївномірно у цілій газовій масі.

Колиж у першїм случаю газ приїде під вплив гравітаційного поля, то молекули одержать прискоренє на долину, і як би не було міжмолекулярних ударень, то небавом мали би долїшні частинки газу більшу скорість, як горїшні. Однак ся рїзниця скоростий не годить ся з термічною рївновагою, яка наступить в наслідок безнастанних міжмолекулярних ударень. В цілій газовій масі настане нова термічна рївновага. Остаточним вислїдом буде обвиженє тяготної точки газової маси і підвишенє температури. Щоби первїсну температуру удержати, треба забрати газови теплоту, яка є рївноважна добуткови з тягару його і обниження тяготної точки. При помочи термодинамічної методи можна доказати, що се обниженє тяготної точки є відворотно пропорціональне до абсолютної температури. По вирівнаню температури буде розміщене молекулів в газі ось яке. Найбільше буде їх там, де потенціальна енергія найменша, отже в найнижших точках резервуару. Закон сего розміщення молекулів подав Boltzmann у своїй „Теорії газів“ (1 часть). Після

нього є відношене густоти газу у двох точках, поміж якими змінює ся потенціальна енергія одного молекула о W , рівна ввазови $\frac{W}{e^{rT}}$, де T є абсолютна температура, r газова молекулярна стала.

Аналогічно можемо робити досліди над молекулами газу, що розміщують ся під впливом зовнішнього магнетного поля. Рухови на долину у першій случаю відповідає у магнетнім полю оборот молекулів з положень найбільшої потенціальної енергії у положенне найменшої потенціальної енергії т. є. з напрямів нормальних до поля у напрями, рівнобіжні до поля. По приверненню термічної рівноваги будуть молекули переважно звернені своїми магнетними осями у напрям поля. Відповідно до повисшого закону Boltzmann'a знаходимо, що густота магнетних осей, припадаюча на одиницю просто-

рового кута, змінює ся пропорціонально до виразу $e^{\frac{MH \cos \alpha}{rT}}$, де $MH \cos \alpha$ означає дотичну зміну потенціальної енергії. Отже число молекулів, яких магнетні осі лежать у просторовім куті $d\omega$, вино-

сить $dn = K \cdot e^{\frac{MH \cos \alpha}{rT}} \cdot d\omega$. Як за елемент просторового кута виберемо кулистий пояс, то дістанемо $d\omega = 2\pi \sin \alpha \cdot d\alpha$, де α може змінювати ся від 0 до π . Коли N є числом молекулів цілого тіла, то одержимо

$$N = 2\pi K \int_0^\pi e^{a \cos \alpha} \cdot \sin \alpha \cdot d\alpha = \frac{2\pi K}{a} (e^a - e^{-a}) \quad \text{I),}$$

$$\text{де} \quad a = \frac{MH}{rT} \quad \text{II).}$$

$$\text{Відси} \quad K = \frac{Na}{4\pi Sh a} \text{)}.$$

Вислідний магнетний момент всіх N молекулів має, розуміє ся, напрям поля і рівнає ся сумі складових поодинових моментів того самого напрямку. Коли в одиниці об'єму є якраз N молекулів, то вислідний момент дає отсей степеень намагнетизованя

$$I = \int_{-1}^{+1} M \cos \alpha \, dn = \int_{-1}^{+1} 2\pi M K x e^{ax} dx,$$

де положено $\cos \alpha = x$.

А тому, що

$$\int_{-1}^{+1} x e^{ax} dx = 2 \left(\frac{Ch a}{a} - \frac{Sh a}{a^2} \right), \text{ то } I = MN \left(\frac{Ch a}{Sh a} - \frac{1}{a} \right) \quad \text{III).}$$

¹⁾ $Sh = \sin. hyperbol$; подібно $Ch = \cosin. hyperbol$.

Отже I є для певної маси газу функцією самого a т. є $\frac{H}{T}$; сей вислід годить ся з попереднім вислідом, введеним на основі термодинаміки.

I стає зером, коли $a=0$, а се наступає для $H=0^1$). За те є $I_0=MN$ для безконечно великого a . Ся вартість I є найбільша і відповідає насиченю, а тим самим явищу, що всі молекулярні магнети звернені у напрям поля. Як субстанції далеко до насичені, то, розвиваючи $Ctgh a$ в ряд і задержуючи лише два члени, одержимо:

$$I = MN \cdot \frac{a}{3} \quad \text{IV)}$$

Відси

$$I = \frac{M^2 N}{3 \cdot n \cdot T} H \quad \text{V)},$$

а магнетна вразливість

$$\kappa = \frac{M^2 N}{3 r T} \quad \text{VI)}.$$

Бачимо, що вона відворотно пропорціональна до абсолютної температури, як сего жадає закон Curie-a.

Дуже легко обчислити намагнетизоване в насиченім стані I_0 , коли дані прочі величини. І так маємо

$$\kappa = \frac{M^2 N}{3 r T} = \frac{M^2 N^2}{3 N r T} = \frac{I_0^2}{3 p},$$

де p є тиснене газу, під яким міримо κ . Колиж вставимо за κ вартість найдену для кисня при нормальнім тисненню і нормальній температурі, рівну $1.43 \cdot 10^{-7}^2$), а тиснене $p=10^6$, то $I_0^2=0.43$, $I_0=0.65$. Кисень є у плиннім стані 500 рази густійший, тому для плинного кисня $I_0 > 325$, тим самим мало що менше від намагнетизованя заліза. Отже бачимо, що плинний кисень має сильні магнетні прикмети, а се годить ся з досьвідом.

Інтересною річю буде подати скорість обігу електронів у кисни. В тій ціли прийемо, що магнетний момент молекулу кисня походить від одного лише електрона, а наряд останнього рівний нарядови йону водня при електролізі; дальше припустимо, що електрон кружляє в коловій дорозі, якої луч однаковий з лучем молекула повітря. На 30. стр. мали ми: $M = \frac{Se}{r}$ або в иншій формі $M = \frac{evr}{2}$,

¹⁾ $\frac{Ch a}{Sh a} = Ctgh a = \frac{1}{a} + 2^2 \cdot \frac{B_1}{2!} a - 2^4 \cdot \frac{B_2}{4!} a + \dots$, де $B_1 = \frac{1}{6}$, $B_2 = \frac{1}{30}$ і т. д.

(Числа Bernouilli; гл. Dziwiński. Wykłady matem. I. стр. 600).

²⁾ Curie. Oeuvres p. 327. Число, подане Curie-м, відносить ся до одиниці маси.

де v є скоростью обігу електрона, а r лучем орбіти його. Тому

$$I_0 = MN = Ne \frac{vr}{2}.$$

На основі електролізи знаємо, що $Ne = 1.22.10^{10} = 0.4$ електромагн. одиниць. Отже при нормальних умовах тиснення і температури є:

$$0.65 = 0.4 \times \frac{1.5.10^{-8}}{2} \cdot v, \text{ а } v = 2.10^8. ^1)$$

Ся скорість є того самого ряду, що скорість електронів в молекулах, найдена иншими способами. Із сих виводів виходить, що вислідний магнетний момент молекула кисня може походити від елементарної струї лише одного електрона, а магнетні ділання инших елементарних струй можуть взаїмно зносити ся. Відси виводить Langevin, що в магнетних молекулах лише оден або що найбільше кілька електронів ріжнить ся від прочих і спричинює магнетні прикмети, а инші електрони співділають лише при витворюваню діяматнетного поля. Можна здогадувати ся, що сї відмінні електрони розложені на обводі молекула і грають ролю у хемічних процесах. Тому був би оправдачий глибокий вплив фізикальних і хемічних перемін на парамагнетні тіла тоді, як діяматнетні в загалі не улягають так дуже сему впливови.

Як вже вище згадано, парамагнетний газ огріває ся, коли впровадимо його у магнетне поле. Се огріте можна легко обчислити. Підчас намагнетизованя дістає газ на одиницю обєму енергію:

$$+ \int H dI = \kappa \cdot \frac{H^2}{2}; \text{ колиж приймемо, що газ задержує сталый обєм,}$$

$$\text{а його питоме тепло при незміннім обємі є } c, \text{ то маємо: } cdT = \frac{\kappa H^2}{2}.$$

При нормальних условилах тиснення і температури є для 1 cm^3 кисня в одиницях C. G. S. $c = 10^{-4}$ (кругло), $\kappa = 1.43.10^{-7}$. Відси $\Delta T = 0.8.10^{-11}. H^2$. Для поля $H = 10000$ выносить підвишенє температури кисня не більше, як $\frac{1}{1000}$ степеня, а для $H = 40000$ доходить ледви до $\frac{1}{100}$; отже огріте дуже слабе.

Ось так виглядає Langevin-ова теорія діяматнетних і парамагнетних тіл. Вона є досить проста подібно, як проста є кінетична теорія ідеальних газів. Як одна, так і друга не займає ся міжмолекулярними діланнями. Останні виступають в течах і цїпких тілах, котрих теорія далеко більше скомплікована. Подібно теорія ферромагнетних тіл повинна бути більше зложена, бо у ферромаг-

¹⁾ Langevin. Ann. chim. phys. VIII. 5. 1905. p. 121.

нетних тіл виступає сильне молекулярне поле, котре вже є з природи, а також міжмолекулярні ділання входять в гру.

Мимо добрих прикмет, як ясности, прозорости і zarazом квалітативної згоди з фактами заходить потреба модифікації теорії Langevin-a. І так н. пр. вже ся засаднича теза теорії, що молекули дімагнетних тіл не улягають напрямлюючому діланню поля, захитала ся під впливом дослідів А. Cotton-a і Н. Mouton-a¹⁾ над подвійним переломанем чистих течий у магнетнім полі; останнє явище аналогічне до феномену Kerr-a в електростатичнім полі. Оба автори доказали, що багато органічних течий ароматичного ряду, як нітробензолъ, бензолъ, монобромак нафталіни і т. д. набувають у магнетнім полі прикмети, подвійно переломлювати світло; се переломанє є додатне, пропорціональне до квадрату поля і стоїть в тісній звязи із будовою молекулів. Досліди Cotton-a і Mouton-a довели їх до висновку, що, хоч згадані течі є дімагнетними тілами, треба приписати їх молекулам можливість орієнтувати ся під впливом поля. Щоби погодити се з теорією Langevin-a, приймають оба автори, що орбіти електронів в молекулі мають особливе розміщенє. Сю гіпстезу можна добре уявити собі на прикладі двох орбіт електронів, як се подають вони за P. Weiss-ом. Отже уявляємо собі дві колові орбіти, яких осередки лежать на тій самій прямій; крім того мають вони поза магнетним полем однаковий час обігу τ і однаковий луч. Електрони, що описують ці орбіти, кружать у противнім змислі. Молекул з такою групою електронів не має вислідного моменту, отже є дімагнетний; однак сей дімагнетизм не є ізотропний. Коли молекул прийде у магнетне поле і то так, що вісь, на котрій лежать осередки обох орбіт, буде рівнобіжна до сили поля, то дістане вона після теорії Langevin-a

момент $2 \delta M = 2 \frac{e S \delta \tau}{\tau^2} = 2 \frac{e^2 H S}{4 \pi m}$; колиж однак умістамо мо-

лекул в полі, якого лінії сил замикають з осью кут α , тоді входити ме в гру лише складова поля у напрямі осі, а вислідний мо-

мент буде $2 \delta M \cos \alpha = 2 \frac{e^2 H}{4 \pi m} \cos \alpha$, при чім припускаємо, що

площа орбіт незмінна відносно до осей молекулів і що орбіти оста-

¹⁾ A. Cotton et H. Mouton. Ann. de Chim. et de Phys. VIII. série. t. XIX, Paris 1910. p. 153; Ann. de Chim. et de Phys. VIII. série. t. XX. Paris 1910. p. 194. Journ. de Phys. 1911. Cinquième série. I. p. 5.

ють колами. Заразом буде ділати на молекул пара сил, пропорційнальна до квадрату поля:

$$2 H \delta M \cos \alpha \sin \alpha = 2 \frac{e^2 H^2}{4 \pi m} \cos \alpha \sin \alpha.$$

Коли в молекулі є n таких пар електронів, а їх орбіти до себе рівнобіжні, то пара сил, що намагає ся обернути молекул, є n рази більша. Ось так можна собі здати справу з того, що діамagnetні молекули можуть також улягати напрямлюючому діланю поля.

Крім висше наведеного явища стоїть ще одна річ на перепоні безоглядному прийняттю теорії Langevin-a, а саме те, що не всі діамagnetні тіла мають вразливість незалежну від температури і поля (се бачили ми добре передовсім у візмуті і антимоні), а знов не всі парамагнетні тіла повнують ся точно законови Curie-a. Особливо новійші дослїди Hond-в¹⁾ і Owen-a²⁾ ведені в інтервалі — 170° до 1200° показують, що у переважної частини діамagnetних елементів вразливість залежить від температури. Се, як також факт, що парамагнетна вразливість часто відступає від закону Curie-a, спонукали E. Schrödinger-a³⁾ доповнити теорію Langevin-a. Він робить се в той спосіб, що приймає дві причини діамagnetизму, перша є Langevin-ова, друга має свою причину у свободних електронах проводу (Leitungselektronen). Останні скручують свої дороги під впливом магнетного поля у діамagnetнім змислі. Приймаючи образ Lorentz-a що до констатувції металів і послугуючи ся Maxwell-евим законом розміщення скоростий молекулів, обчисляє Schrödinger магнетну вразливість одиниці об'єму, що походить від свободних електронів, і одержує

$$\kappa = -\frac{1}{3} \frac{e^2}{m} \lambda^2 N \left(1 - 2 \alpha^2 + 4 \alpha^3 e^{\alpha^2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)$$

де поодинокі знаки мають отсе значіне: e наряд електрона, m його маса, λ свободна довгота дороги електрона, N число всіх електронів в одиниці об'єму,

$$\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{\lambda e H}{m \sqrt{c^2}}$$

H = сила поля, c = середна скорість електрона, $sg \alpha$ = знак α .

¹⁾ Honda. Ann. 32. p. 1027. (1910).

²⁾ Owen. Ann. 37, p. 657. (1912).

³⁾ Erwin Schrödinger. Zur kinetischen Theorie des Magnetismus. Sitzungsber. der Akad. d. Wissensch. in Wien. Math. naturw. Klasse. Bd. CXXI, Abt II. a. Juli 1912.

α є (упротив 1 дуже мале, навіть для найсильніших знаних піль ($H = 5.10^4$), бо після Riecke¹⁾ $\lambda = 6.10^{-8}$ cm для всіх металів,

$\sqrt{c^2} = 10.7.10^6$ cm/sec. при 180°), а $\frac{\epsilon}{m} = 1.79.10^7$; отже є

$$\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot 5.10^{-3}.$$

Тому можемо в першій зближенні покласти $\kappa = -\frac{1}{3} \cdot \frac{\epsilon^2}{m} \lambda^2 N$.

Однак κ обчислені після сеї формулки і обсервовані значно різнять ся від себе. Особливо виступають різниці ярко для найліпше проводячих металів: міді і срібла. І так обчислене κ міді вивносить 178.10^{-6} , а найдене Hond ом і Owen ом $0.76.10^{-6}$; обчислене κ срібла є 202.10^{-6} , а найдене Hond-ом і Owen-ом 2.10^{-6} .

Щоби усунути сю незгідність, припускає Schrödinger²⁾, що в багатьох случаях діамagnetизм свободних електронів закритий по часті парамагнетизмом. В загалі є після Schrödinger-а три причини магнетної вразливості:

1. Індукція в елементарних проводах звязаних електронів (Langevin-овий діамagnetизм, незалежний від температури).

2. Напряблююче діланє поля на магнетні молекули (Langevin-овий парамагнетизм, Curie-євий закон пропорціональної вразливості до відверненої абсолютної температури).

3. Скривленє доріг свободних електронів у магнетнім полі (κ змінє ся з температурою враз з $N\lambda^2$).

Вразливість, яку обсервуємо, є сумою всіх трех членів.

У сильно парамагнетних металів (*Ce, Ne, Pr, Er*), що сповняють докладно закон Curie-а, переважає 2-га причина тому, що вони мабуть не мають високої спроможности проводу. Парамагнетні гази (O_2) і електроліти також в згоді з законом Curie-а, але у них відпадає причина 3., бо нема свободних електронів.

Добрі ізолятори, як *P, S, SiO₂*, у яких відпадає також 3-а причина, мають діамagnetну вразливість, незалежну від температури.

Мідь має безперечно скритий парамагнетизм³⁾, закритий сильним діамagnetизмом свободних електронів тим більше, що соли міді парамагнетні.

¹⁾ Riecke. Phys. ZS. 1909. p. 512.

²⁾ Schrödinger. ibid. p. 13.

³⁾ Гл. дослід Gray-а і Rossa. Phys. ZS. 10, p. 59. 1909.

Коли возьмемо під увагу точніший вираз на χ , а саме

$$\chi = - \frac{1}{3} \cdot \frac{\varepsilon^2}{m} \cdot \lambda^2 N (1 - 2\alpha^2),$$

то в той спосіб впровадимо залежність від сили поля H , бо α є пропорціональне до H . Ся залежність є дуже слаба тому, що α , як ми вище бачили, є незвичайно мале навіть у високих полях. В кождім разі діамагнетна вразливість свободних електронів слабне в міру зросту сили поля; однак при найкориснійших умовах і при ужитю найсильнішого доси знаного поля вносять сей убуток діамагнетизму найбільше $\frac{3}{4}\%$. Вище сказане відносить ся до звичайної температури. Тому, що з маліючою температурою росте λ , а c^2 маліє, буде убуток діамагнетизму при низьких температурах більший. Schrödinger обчисляє приблизно, що в температурі киплячого водня у найсильніших полях повинна маліти вразливість міді бодай о четвертину своєї вартости, коли припустити, що парамагнетизм міді не залежить від поля. Коли б H росло безконечно, то тоді мусіли би ми брати повну (первісну) формулку на χ , а вираз у скобці дав би $\frac{3}{2}\alpha^{-2}$. Відси вийшло би, що намагнетизоване для дуже високих піль відворотно пропорціональне до поля H .

Теорія Schrödinger-а дає гарне доповнене Langevin-ової, однак має сю хибу, що верифікація її тяжка. Н. пр. возьмім случай міді; ту виступають після гіпотези його аж три причини магнетної вразливости, однак тяжко буде дослідити експериментом, кільки припадає на долю кожного члена магнетної вразливости. Дальше слабою стороною є дуже велике число припущень і zaloжень, що на основі їх ся теорія розвинена¹⁾.

Вкінці треба згадати також проби модифікації Langevin-ової теорії, переведені при помочи теорії квантів, при чім в основу покладено досліди парамагнетних тіл при дуже низькій температурі.

Відповідно до сего виводить P. Debye²⁾ рівняне $\chi = \frac{C}{T} \cdot \frac{\varepsilon}{ekT}$, де ε є квантом енергії, C і k сталі величини. Коли T досить високе, то се рівняне дає приблизно закон Curie-а; для дуже низьких температур відповідає воно добре магнетним прикметам плинного і цїпкого кисня. E. Oosterhuis³⁾ знов відступає від zaloження, що після нього вивів Langevin свою теорію і що висказує пропорціональність між оборотовою енергією U і температурою T , а замість нього приймає за Einstein-ом і Stern-ом на оборотову енергію молекула з двома степенями свободи (Freiheitsgrade) вираз

¹⁾ Schrödinger. p. 3.

²⁾ P. Debye. Arch. sc. phys. et nat. 3², p. 151.

³⁾ E. Oosterhuis. Commun. Suppl. Nr. 31, 1913.

у виді $U = \frac{h\nu}{ekT - 1} + \frac{1}{2}h\nu$, де ν є скількість оборотів молекула

в одиниці часу (Frequenz), h і k сталі теорії Planck-a. Після сєї гіпотези молекул має навіть при температурі абсолютного зера енергію, якої величина рівна $\frac{1}{2}h\nu$. Коли-ж враз з Einstein-ом і Stern-ом кладемо $\nu^2 = 2\nu_0 \cdot \frac{U}{h}$, де ν_0 є вартостію числа ν при дуже

низьких температурах, одержимо: $\frac{1}{\chi} = C(T + \Delta)$. Стала $\Delta = \frac{1}{6} \frac{h\nu_0}{k}$

і має для різних тіл різнну вартість. Субстанції, яких Δ дуже мале, є згідні із законом Curie-a н. пр. безводний $MnSO_4$. Протівно н. пр. платина відступає від нього тому, що для неї $\frac{h\nu_0}{k} = 1500$;

видко, її енергія при температурі абсолютного зера дуже велика. Тому, що ν_0 є відворотно пропорціональне до моменту безвладности молекула I^1), більших збочень від закону Curie-a можна сподівати ся лише у тіл з легкими молекулами н. пр. у безводного $MnSO_4$. За те н. пр. $Gd_2(SO_4)_3 + 8H_2O$ має дуже тяжкий молекул, обтяжений ще до того 8 молекулами води. Тому збоченя його від закону Curie-a ледви слідні навіть у щільнім водні²). З величини моменту безвладности I безводного і кристалічного $MnSO_4$ обчислив Oosterhuis віддаль між осередками молекулів кристалічної води і молекулу сірчану; вона виносить 4.4×10^{-9} , отже є менша від луча молекула (луч молекула водня $= 1 \times 10^{-8}$). З того виходить інтересний висновок, що молекули кристалічної води по часті вникають у нутро молекулів солей.

Згадані модифікації теорії Langevin-a не можуть ще вповні задоволити і виповнити всі недостачі її. Доперва тоді буде можна відповідно змодифікувати її, коли стане до розпорядимости ще більший чисельний матеріал, а молекулярна фізика osiąгне ще більший степен розвитку, як до тепер.

6. Weiss-a теорія ферромагнетних тіл.

A) Теорія молекулярного поля.

У своїй роботі про магнетні првкмети тіл вказав P. Curie³) на аналогію поміж критичною температурою газів а температурою

¹) Бо $U = \frac{1}{2} I \cdot (2\pi\nu)^2$. Для $T=0$ є $\frac{1}{2} h\nu_0 = \frac{1}{2} I(2\pi\nu_0)^2$ (з рівняня на U в тексті) або $\nu_0 = \frac{h}{4\pi^2 I}$.

²) Kamerlingh Onnes a. A. Perrier. Commun. phys. lab. Leiden. Nr. 122. 1912. ³) P. Curie. Oeuvres p. 330.

трансформації ферромагнетних тіл. Langevin¹⁾, подаючи свою теорію парамагнетизму, висказав думку, що для пояснення ферромагнетних прикмет треба буде втягнути міжмолекулярні ділання; останні введено в теорію неідеальних газів і течій, а відносини між ними і ідеальними газами подібні до відносин між парамагнетними і ферромагнетними тілами. Ідучи за сим слідом поставив Р. Weiss²⁾ теорію ферромагнетних тіл, що пояснює дуже гарно їх прикмети і до тепер годять ся вповні з вислідами досвіду. Коли порівнаємо сю теорію з Langevin-овою, то насуває ся нам на думку відношене законів ідеальних газів до закону van der Waals-a. Як знаємо, поставив останній гіпотезу про міжмолекулярні ділання газів і течій; через те виступає у сій теорії внутрішнє тиснене, що додає ся до внішнього. Подібно впровадив Р. Weiss молекулярне поле; воно додає ся до внішнього і пояснює при помочи законів парамагнетизму сильний степен ь намагнетизованя ферромагнетних тіл.

Гіпотеза Р. Weiss-a представляє ся ось як. Діланє всіх молекулів ферромагнетного тіла на оден з поміж них є рівноважне (еквівалентне) з магнетним однородним полем, яке є пропорціональне до степеня намагнетизованя тіла і має той сам напрям, що магнетизм його. Се поле є $H_m = NI$, де N є стала, а I степен ь намагнетизованя. Коли зведемо останній на молекулярне намагнетизованє т. зн. магнетний момент грамомолекула σ_m при помочи рівняня: $I = \frac{D}{m} \sigma_m$, де D є густина, а m молекулярний тягар, одержимо рівнянє:

$$H_m = N \frac{D}{m} \sigma_m \quad 1).$$

Заразом треба зазначити, що на даний молекул ділають лише молекули, обняті його сферою ділання.

Сі міжмолекулярні ділання спричиняють по думці Р. Weiss-a самотійне (spontan) намагнетизованє ферромагнетних тіл. Се треба розуміти так. Ферромагнетні тіла можуть мати магнетні прикмети і без впливу внішнього поля подібно, як в деяких случаях течя задержують свій стан скупности помимо того, що внішнього тисненя зовсім нема; лише внутрішнє тисненє піддержує

¹⁾ Langevin, Journ. de Phys. IV. 1905. p. 678.

²⁾ Р. Weiss. Journ. de Phys. 1907. p. 661; 1911. p. 900; Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellsch. 1911. s. 718; Les idées modernes sur la constitution de la matière. Conférences faites en 1912. Paris 1912. p. 832. La théorie du rayonnement et les quanta. Rapp. de la réunion a Bruxelles. Langevin p. 393. Paris 1912.

їх плинний стан. Однак заходить питане, чому се самостійне намагнетизоване не проявляє ся на зверх? Таж лише внішне поле, що дідало колись або ділає тепер, робить ферромагнетні тіла магнетними! На се дає Weiss отсе пояснене. Ферромагнетні тіла складають ся з дуже багатьох маленьких кристаликів; кождий з них магнетизує ся самостійно в напрямі, данім його формою і внутрішньою кристалічною будовою. Напрям намагнетизованя є в кождім кристалі взагалі ріжний; він змінєє ся від кристалику до кристалику так, що звичайно середній магнетизм цілого тіла рівнає ся зеру, коли, розуміє ся, кристалики достаточнo малі. Внішне поле не збуджує намагнетизованя, воно лише чинить його доступним обсервації, звертаючи його у поодиноких частях субстанції в оден напрям. І коли дійсно стане ся се для кождої части тіла, тоді зможемо обсервувати самостійне намагнетизоване у його дійсній величині; але на те треба дуже сильного поля. Після сего погляду нема основної ріжниці між намагнетизованим тілом і таким, що даєть ся сильно намагнетизувати. Оба намагнетизовані до насиченя, лише в першім намагнетизоване всюди рівнобіжне, в другім неупорядковане.

Внішне поле змінєє лише дуже незначно степенъ намагнетизованя, спричинений внутрішнім полем тому, що останне в порівнаню з найсильнішими знаними магнетними полями є дуже велике. Тому в дальшій виводі можемо покищо обмежити ся на случай, що внішнього поля нема, а є лише внутрішнє H_m . Коли введемо його у рівнане II) стр. 36. одержимо:

$$\alpha = \frac{\sigma_{m0} N D}{m R T} \cdot \sigma_m, \quad 1) \quad 2)$$

де σ_{m0} є найбільша вартість величини σ_m (ві осягає σ_m при 0° абсолютної скалі, при якій нема термічного руху і напрямляюче ділане поля не дізнає ніякої перешкоди), R газова стала, віднесена до грамомолекула ($R = 83.155 \times 10^6$ ергів на степенъ). Се рівнане, зображене на фігурі 7., як пряма OA .

З другої сторони Langevin-ове рівнане для парамагнетних тіл (гл. 36. стр. III. рівнане) можна написати в виді:

1) Рівнане $\alpha = \frac{MH}{rT}$ відносить ся до якоїнебудь маси тіла. Тому, що степенъ намагнетизованя $I_0 = MN_1$, де N_1 є числом молекулів тіла, маємо $\alpha = \frac{I_0 H}{N_1 r T} = \frac{D}{m} \frac{\sigma_{m0} H}{N_1 r T} = \frac{\sigma_{m0} H}{R T}$, де R є газова стала, віднесена до грамомолекула. Вставляючи за H вартість з 1), одержимо 2).

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = \operatorname{cotgh} a - \frac{1}{a}. \quad 3)$$

Оба останні рівняння дають зв'язь поміж σ_m і T . Послідня величина міститься в a , тому треба ці рівняння розв'язати і знайти із них систем незвісних a , $\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}}$. Сю розв'язку найлекше переводить ся графічною дорогою. А саме рівняне 3) дає криву OAB . Ця крива має в початку співрядних тангенту, якої співчинник напряду рівнає ся $\frac{1}{3}$; вона сама простягає ся в ∞ і має асимптоту $\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = 1$ для $a = \infty$. Крива OAB перетинає ся з прямою OA в двох точках: O і A . В точці O є $a = N$, $H_m = 0$, $\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = 0$; вона зображує безперечно несталий (nicht stabil) стан. Сталий стан є даний точкою пересічи A . Напрядний співчинник прямої OA залежить від температури. Чим вона низша, тим він менший, а тим самим точка пересічи A , отже дана вартість σ_m , пересуває ся у напряду абсолютного насичення. Останнє буде для $T = 0$, бо тоді $\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = 1$. Тому то в сусідстві температури абсолютного зера можна легко одержати майже повне насиченє ферромагнетних тіл, що доказали Kamerlingh Onnes і P. Weiss для заліза, нікю і кобальту.

Коли-ж температура підносить ся, пряма OA буде що раз стрімкіша, а тим самим намагнетизованє ставати ме слабше. Вкінці приїдемо до температури 0 , для якої пряма OA стає стичною. Її співчинник напряду є тоді:

$$\frac{m R \Theta}{\sigma_{m0}^2 \cdot N D} = \frac{1}{3}. \quad 4)$$

Температура Θ се є температура трансформації ферромагнетних тіл або т. зв. точка Curie-а. Повише її субстанція не магнетизує ся самотійно, лише під впливом внішного магнетного поля, отже стає парамагнетна. Як з повишого виходить (гл. стр. 14.), мають парамагнетні тіла характеристичну сталу, звану сталою Curie-а. Між нею а точкою Curie-а можна легко знайти зв'язь. Знаючи, що для парамагнетних тіл a навіть у найвисших полях одержує дуже малі вартості (гл. стр. 37.), можемо обмежити ся лише до найвисших членів ряду, у який розвиваємо $\operatorname{cotgh} a$ рівняня 3) і одержимо:

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = \frac{a}{3}. \quad 5)$$

А що
$$a = \frac{\sigma_{m0} H}{R T} \quad 6)$$

(гл. стр. 45. в нотці), то співчинник молекулярного намагнетизованя

$$\chi_m = \frac{\sigma_m}{H} = \frac{\sigma_{m0}^2}{3 R T}, \quad 7)$$

а молекулярна стала Curie'a

$$C_m = \chi_m \cdot T = \frac{\sigma_{m0}^2}{3 R}. \quad 8)$$

Коли сполучимо 8) з 4), одержимо

$$\Theta = \frac{C_m}{m} \cdot N D \quad 9)$$

або
$$\Theta = C N D, \quad 9 \text{ а})$$

де C є сталою Curie'a, віднесеною до одиниці маси. Це рівняння дуже вигідне, бо на основі його можна обчислити сталу молекулярного поля N при помочи величин, що дають ся мірити безпосередно.

Через злуку рівнянь 2) і 4) вийде отся інтересна зв'язь між температурою і молекулярним намагнетизованєм:

$$\frac{I}{\Theta} = \frac{3}{a} \cdot \frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}}, \quad 10)$$

котра wraz з рівнянем 3) дає закон зміни самостійного намагнетизованя в залежності від температури.

Сей закон стверджено для магнетиту, для піротину у значній частині температурного інтервалу, для ступу $Fe_2 Ni$ в інтервалі від 0° до Θ° , але для заліза, нікю і кобальту сконстатовано лише приблизну згоду з рівнянем 10).

Доси обговорювали ми стан ферромагнетних тіл під впливом внутрішнього поля; тепер возьмемо під увагу також зовнішнє поле H_a . Отже маємо рівняне:

$$H = H_a + N I, \quad 11)$$

де H є ціле поле, що ділає на субстанцію, а $N I$ внутрішнє. В тім случаю одержить рівняне 6) вид:

$$a = \frac{\sigma_{m0}}{R T} \left(H_a + N \frac{D}{m} \sigma_m \right) \quad 12)$$

і дасть в зв'язи з 5):

$$\frac{\sigma_m}{\sigma_{m0}} = \frac{\sigma_{m0}}{3 R T} \left(H_a + N \frac{D}{m} \sigma_m \right).$$

Відки виходить

$$\sigma_m \left(T - \frac{N D \sigma_{m0}^2}{3 m R} \right) = \frac{\sigma_{m0}^2 H_a}{3 R}$$

або з огляду на 8) і 9)

$$\sigma_m (T - \Theta) = C_m H_a.$$

Тому, що $\chi_m = \frac{\sigma_m}{H_a}$, одержимо

$$\chi_m (T - \Theta) = C_m. \quad (13)$$

Посліднє рівнянє вказує на те, що магнетна вразливість ферромагнетних тіл улягає поверх точки Curie-а педібному заковови, як парамагнетна вразливість. Одвак є важна ріжниця; коли у парамагнетних тіл є χ відворотно пропорціональне до абсолютної температури, то у ферромагнетних відносять ся отєя залежність лєше до надвишки температури понад температуру трансформації.

Се рівнянє важне також тому, що на основі його легко обчислити сталу Curie-а C_m з χ_m і $T - \Theta$ тим більше, що воно годить ся точно з експериментальними дослідями. Порівнюючи вислєди робіт Curie-а з останнім рівнянєм, сконстатував Weiss дуже добру згоду. Опісля ствердив він се враз з Foëx-ом¹⁾ на основі власних помірів. Доси не найдено виїмків від сего закова, що найбільше зауважано зміни, що відповідають ріжним алїотропічним відмінам. Дуже добре видко се на 8. фіг., поданий після Weiss а і Foëx-а²⁾.

На ній представлено звязь між $\frac{1}{\chi_m \cdot 10^5}$ і температурою в степенях

Цельзія для кількох ферромагнетних субстанцій на основі експериментальних дослідів. Бачимо, що ся звязь зображена самими прямими лініями відповідно до рівняня $\frac{1}{\chi_m} = \frac{1}{C_m} (T - \Theta)$; однак кож-

да субстанція має більше прямих, як одну, залежно від того, у які алїотропічні відміни переходить вона при підвишуваню температури. І так нікель має дві, перегороджені температурою 412° С; кобальт також дві, понизше і повнєше 1241° С, зелїзо чотири в інтервалах: 774° — 828°, 828° — 920°, 920° — 1395° і поверх 1395°; магнетит пять. Послїдна пряма магнетиту повнєше 900° не нарисована на фігурі, але вона виходить з помірів Curie-а. Додати треба, що між 680° а 710° не дає магнетит прямої лінії, лише криву, що відповідає переходовому станови. Для зелїза знов є характеристичною нагла переміна вразливости χ при 920° і 1395°, що вже впрочім давнїйше зауважав Curie.

Що гіпотеза молекулярного поля має багато правдоподібности, бачимо не лише з попереднього, але також із дослідів у вишїм на-

¹⁾ Weiss et Foëx. Journ. de phys. 1, 1911, p. 744.

²⁾ Поділєка для χ є на фігурі инша у віклю, як у других тіл; те саме відносьє ся до поділки температури для магнетиту.

прямі. Знаною є вже від якогось часу термічна аномалія в точці Curie-а. Остання полягає в наглім збільшенню питомого тепла при температурі трансформації. Сей¹⁾ приріст пит. тепла виносить для магнетного тіла:

$$c' = \frac{1}{J} \cdot \frac{dE}{dT},$$

де J є рівноважник, а E енергія намагнетизованя, зведена на одиницю маси. Ся енергія $E = -\frac{1}{2} H_m \sigma$, де H_m є молекулярне поле, а σ питомий степеень намагнетизованя. Як бачимо, можна c' означити на основі чисто магнетних досвідів. Величина c' є дуже мала при низьких температурах, близько температури Θ росте дуже швидко, а поверх її маліє до зера. Отже основою термічного явища є тепло відмагнетизованя, що зуживає ся в цілїм інтервалі від абсолютного зера до Θ^0 і якого нагле щезанє спричинює аномалію.

P. Weiss і P. N. Beck¹⁾ мірили магнетним і калориметричним способом сю аномалію питомого тепла ферромагнетних тіл в точці Curie-а і нашли однакові висліди.

Б) Гіпотеза магнетону.

Досліди Weiss-а над магнетитом привели його до гіпотези магнетону. Мірячи сталу Curie-а магнетиту вище температури трансформації зауважали Weiss і G. Foëx²⁾, що магнетит має кілька вартостей сеї сталої, з котрих кожда відповідає окремому інтервалови температури; при тім всім перехід з одного інтервалу у другий відбуває ся нагло, як се добре бачимо на фіг. 8. Бажаючи пояснити се явище, застановляв ся Weiss над рівнянем $C_m = \frac{\sigma_{m0}^2}{3R}$ (гл. стр. 47. рівн. 8.), котре з огляду на звязи: $C_m = C \cdot m$, $\sigma_{m0} = S_0 \cdot m$ можемо написати: $C = \frac{m \cdot S_0^2}{3R}$, де S_0 є намагнетизованєм в насиченім стані, віднесеним до одиниці маси. Тому, що R є незмінною величиною, Weiss прийшов до висновку, що нагла переміна сталої C залежить або від зміни молекулярного тягару m або від зміни магнетного моменту S_0 . Перше не може бути, бо инакше мусіло би се припустити, що враз із підвишенєм температури молекули магнетиту полімеризують ся, а се суперечне з досвідом; таж знаємо, що при висших температурах молекули улягають діссоціації. Отже не

¹⁾ Weiss et Beck. Journ. de phys. 7, 1908, p. 249.

²⁾ Weiss et Foëx. Journ. de phys. 1, 1911, p. 744.

лишає ся нічого иншого, як лише прийняти, що магнетний момент молекула магнетиту змінєє ся при певних температурах о якусь певну величину.

Коли на основі послідньої гіпотези обчислимо S_0 з рівняня $C = \frac{m S_0^2}{3 R}$ для поодиноких інтервалів температури, дістанемо нижню таблицю¹⁾

Інтервал 0°	S_0 після Foëx-a	S_0 після Weiss-a	Відношенє
581 - 622	1	1	1
622 - 680	1.238	1.22	1.25
710 - 770	1.535	1.513	1.5
770 - 900	2.013	1.995	2
> 900 (Curie)	2.515	2.515	2.5

Числа послідного ряду відносять ся до себе, як 4:5:6:8:10. Відєн бачимо, що молекулярний момент магнетиту змінєє ся враз з температурою у нетяглий спосіб, а поодинокі вартости його відносять ся до себе, як прості цілі числа. Огже вони є многократями одної спільної величини.

Подібну просту звязь подибуємо між молекулярними моментами заліза і ніккю, що їх найшли Weiss і Kamerlingh Onnes²⁾ при температурі киплячого водня (20° абсол. темп.). З досвіду знаємо — що виходить впрочім з розміркованя — що при дуже низьких температурах можна легко осягнути стан насиченя, бо в сїм случаю термічний рух майже не заколючує порядку молекулярних осей, який завдячуємо намагнетизованю. Огже магнетні моменти, мірені при так низьких температурах, можемо вважати моментами насиченя. Weiss і Kamerlingh Onnes одержали для сих моментів вартости: для заліза 12360, для ніккю 3370. Сі числа відносять ся до себе, як 11:3, т. зн. вони є многократями числа 1123.5, бо

$$12360 = 11 \times 1123.5$$

$$3370 = 3 \times 1123.5$$

$$\text{Середна вартість} = 1123.5.$$

Огже бачимо, що моменти граматомів³⁾ (молів) заліза і ніккю мають спільний подільник. Його зове Weiss граммагнетомом. Коли-ж

¹⁾ Weiss. Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellschaft. 1911. p. 735.

²⁾ Weiss et Kamerlingh Onnes. Journ. de phys. 9, 1910. p. 555.

³⁾ Weiss припускає, що в дуже богатых случаях магнетний молекул складає ся лише з одного атома.

поділимо граммагнетон через число Loschmidt-а т. є. число атомів у граматомі, то одержимо магнетний момент атому т. є. елементарного магнету, магнетон. При помочи нової вартости Loschmidt-ового числа, поданої Perrin-ом¹⁾ (1910) : 68.5×10^{22} виходить вартість магнетону: — $16.4.10^{-22}$. Отже оден атом заліза складає ся із 11 магнетонів, а атом нікелю із 3 магнетонів. Також для кобальту найдено (O. Bloch, 1912), що його молекулярний момент є многократню магнетона, а саме число магнетонів кобальту $n = 8.925$ т. є. кругло $n = 9$ з точністю експериментальних помірив. Тому, що для згаданих трех субстанцій одержано так знаменні висліди, старав ся Weiss прослідити, чи не можна найти магнетонів також в інших тілах. Сі досліди увінчали ся незвичайними успіхами. Найперше перейшов Weiss помірив, роблені Pascal-ем²⁾ над розчинами парамагнетних солей. Опираючи ся на аддитивнім законі магнетних прикмет хемічних сполук³⁾ поправив він висліди Pascal-а, відіймаючи від них діамагнетні вразливости елементів, з яких ті соли складають ся, і порівняв їх із магнетоном. Показало ся вже навіть без поправок, що переважна часть магнетних моментів сих солей є многократями магнетона. Поміж 27 субстанціями, міреними Pascal-ем, лише три не годять ся з теорією магнетонів: потасово-амоновозелізівий цияняк, $(SO_4)_2 V_2 O_3$ і VCl_4 ; мірною є згідність для $FeSO_4$, кобальтово-амонового хлораку, манганового пірофосфорану, обох хромових галунів (фіолетного і зеленого), сірчану міді і VCl_2 ; тут можна пояснити незгідність при помочи границь експериментальних похибок, поданих Pascal-ем (1% для σ_{m0}). За те для прочих 17 тіл, а саме солей Fe , Co , Mn , Cu , Hg , U є знаменита згода з теорією, коли узгляднимо також поміри Liebcknecht-а і Wills-а⁴⁾. Правдивість сего стверджує отсей виказ числа магнетонів поодиноких солей.

Число магнетонів.

1. K і амоново-зелізівий цияняк.	10.41, кругло 10.
2. Fe і амоновий пірофосфоран.	21.89, „ 22.
3. Fe і амоновий цитринан.	21.96, „ 22.
4. Na і зелізівий пірофосфоран.	24.04, „ 24.
5. Na і зелізівий метафосфоран.	28.03, „ 28.
6. Зелізівий хлорак.	27.93, „ 28.

¹⁾ Weiss. Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellsch. 1911, s. 733.

²⁾ Pascal. Ann. de chim. et phys. (8). 16, p. 531, 1909.

³⁾ Pascal. Ann. de chim. et phys. (8) 19, 5, 1910.

⁴⁾ Liebcknecht und Wills, Ann. d. Phys. (4) 1, 178, 1900.

7. Зелізовий сірчан.	30·09, кругло 30.
8. <i>K</i> - зелізавий метафосфоран.	25·99, " 26.
9. <i>Na</i> - зелізавий щаван.	27·11, " 27.
10. <i>Na</i> - зелізавий пірофосфоран.	27·91, " 28.
11. Зелізавий сірчан.	27·69, " 28.
12. Кобальтовий хльорак.	25·08, " 25.
13. Манганавий сірчан.	29·87, " 30.
14. <i>K</i> - надманганан.	4·11, " 4.
15. Сірчан міді.	9·75, " 10.
16. <i>Cu</i> і амонієвий сірчан.	6·03, " 6.
17. Уранавий сірчан.	14·03, " 14.

Сі висліди, як також інші висліди, зображені на фігурі 9., поданій P. Weiss-ом.

Ся фігура зображує скалю, зложену із 32 вертикальних ліній, із яких кожда подає число магнетонів. Сю скалю сконструував Weiss на основі вартостей магнетону, виведених висше із зеліза і ніккю. Останні лежать на першій поземій лінії з гори і зазначені стрілкою. Вартости, виведені з помірив Bloch-a, зазначені переверненням хрестиком. На третій і четвертій поземій находимо висліди Pascal-евих помірив, зазначені колісцятами. Як видко, майже всі згадані точки лежать на вертикальних лініях або дуже близько них; отже можемо сконстатувати, що гіпотеза магнетонів має сильну основу. Weiss спробував вивести величину магнетону на основі самих вислідів Pascal-a і найшов (гл. фіг. 9.) із вартостей для (2, 3), 4, 8, (5, 6, 10, 11), 7 методом найменших квадратів: 1122·1; се число ріжнить ся лише о 1·3‰ від поданого висше: 1123·5.

Інтересні є також вартости виведені із розчинів ніклевих солей на основі праць Liebknechta і Wills-a. До сих солей належать: NiF_2 , $NiCl_2$, $NiBr_2$, NiI_2 , $NiSO_4$, $Ni(NO_3)_2$; вони дають отсі числа магнетонів: 16·06, 16·11, 16·06, 16·01, 15·95, 16·02 т. є. з докладністю помірив 16.

Також поміри, переведені над цїпкими магнетними солями п-ною E. Feytis¹⁾, дають корисні висліди для теорії магнетонів. Сі поміри відносять ся до солей зеліза, кобальту, хрому і до Mn_3O_4 . Найбільше віддалене від цілого числа подибуємо у $FeF_3 + 3H_2O$, а саме $n = 21·23$; отже ріжниця виносить 0·23. Впрочім є ріжницї дуже малі, пересічно 0·50‰ найблизшого цілого числа.

Вкінці треба згадати найновіші поміри Weiss-a і Foëx-a²⁾, як також Bloch-a над сталою Curie-a ферромагнетних металів

¹⁾ E. Feytis, C. R. 152, 708, 1911.

²⁾ Weiss і Foëx, Arch. d. scienc. phys. et nat. (4) 31, 4 і 89, 1911.

повисше точки Curie а. На фігурі зазначені перші прямим хрестиком, другі перевертеним. Після них має чистий нікель $\sigma_{m_0} = 9018$, що відповідає 8·03 магнетонам, коли вважати мемо величиною грамагнетона число 1123·5. Сі числа відносять ся до температури 400°; як підемо висше 500°, одержимо 9 магнетонів. Те саме число виходить з помірив над стопом Ni і $Fe_2 Ni$. Тут виходить для нікелю число 9·03 магнетонів.

Коли приглянемо ся ближше вислідам помірив над ніклем, побачимо, що він приймає різне число магнетонів, а саме при дуже низьких температурах 3, у стопі із залізом 9, при високих температурах 8 і 9, в розчинах солий 16. Сей приклад показує, що молекулярне намагнетизоване змінє ся враз із фізикальним і хемічним станом субстанції. Сі зміни відповідають завжди цілим числам магнетонів.

Подібні прикмети подибуємо у кобальту і заліза. O. Bloch найшов для чистого кобальту $n = 15·008$, а для кобальту в стопах $n = 14·925$ тоді, як при дуже низьких температурах число магнетонів кобальту є 9. Залізо дає висше точки Curie-а три різні вартости сталої Curie-а в інтервалах температури: 774° — 828°, 828° — 920°, 920° — 1395°. Вартости σ_{m_0} , що відповідають їм, не підходять під загальний закон, однак згідність осягнемо, коли приймемо враз з Weiss-ом деполімеризацію магнетних молекулів. Тоді вийдуть числа магнетонів: 12·08 (= 12), 10·04 (= 10), 19·95 (= 20).

Інтересний вивід подає Weiss із останніх вислідів. Для першого і другого* інтервалу температур є $\sigma_{m_0} = 13427$, зглядно 11297. Їх відношенє є 6:5 (з точностю експериментальних помірив). Відси спільна міра магнетних моментів є:

$$\frac{13427 + 11297}{6 + 5} = 2247·6.$$

Половина з того 1123·8 містять ся точно 11 рази у молекулярнім моменті заліза при дуже низькій температурі. Отже тут маємо новий доказ єствованя магнетонів. Висліди праць Weiss-а і школи його дадуть ся зібрати в отснх кількох словах. Найперше повело ся найти молекулярні, зглядно атомові моменти більшої скількості пара- і ферромагнетних тіл. Сі молекулярні моменти одержуємо, ділячи магнетні моменти грамомолекула числом молекулів у грамомолекулі. Заразом сконстатовано, що деякі субстанції мають кілька різних атомових моментів залежно від температури і хемічного складу. Всі ті моменти відносять ся до себе, як прості цілі числа. Вони мають спільний подільник, що його назвав Weiss магнетоном.

На основі дотеперішних дослідів можна прийняти, що магнетон є спільним елементом багатьох магнетних атомів, а мабуть і всіх.

Сю прикмету подибуємо також у діаманетних первнів, що творять парамагнетні сполуки н. пр. у *Cu*. Замітною також є сполука K_2HgI_4 , що є парамагнетною, хоч складає ся із самих діаманетних первнів. Для неї є число магнетонів $n = 8.88$, отже кругло 9.

Закони смугових дуговин промовляють також за теорією магнетонів. Як звісно, W. Ritz представив їх дуже наглядно при помочи електромагнетного механізму. У сїм механізмі находимо магнетні штабки з певним моментом, звернені в оден бік і сполучені із собою у прямолінійний магнет. Ся часть моделю відповідає Weiss-овим атомовим моментам, що складають ся з магнетонів. Зідентифікувавши сї магнетні штабки з магнетонами, Weiss обчисляє довготу магнетона $\varepsilon = 1.12 \cdot 10^{-10}$ см. Се число є можливе, коли пригадаємо собі, що промір атома вносять від 10^{-6} до 10^{-7} см, а промір електрона 10^{-13} .

Вкінці годить ся гадати, що Langevin¹⁾ спробував шукати звязи між гіпотезою магнетону і модерною тепер гіпотезою квантів у Sommerfeld-овій²⁾ формі. Він вийшов із założеня, що магнетний момент молекула є збуджений обігом електрона, якого наряд є e , маса m і що центр іравітації ділає на електрон з силою відвортно пропорціональною до n -тої степені віддаленя r . Діланє, що відповідає періоді обігу електронів, кладе Langevin рівне $\frac{h}{4}$, де h є після Sommerfelda т. зв. елементарним квантом ділання. Се $h = \varepsilon T$, де ε є елементом енергії, T часом, якого потребує дане тіло до поглотчення зглядно до випромінюваня енергії ε . Величина $h = 6.55 \cdot 10^{-27}$ ergsec і є загальною сталою. На основі сих założень найшов Langevin магнетний момент ірамомолекула

$$I_0 = \frac{N_1 e}{m} \cdot \frac{h}{8\pi} \cdot \frac{n}{n+2},$$

де N_1 є числом молекулів в ірамомолекулі. Тому, що $N_1 = 7 \cdot 10^{23}$, $\frac{e}{m} = 1.77 \cdot 10^7$, виходить для $n = 1$, $I_0 = 1080$.

Се число годить ся досить добре з магнетоном Weiss-a.

Гіпотеза магнетонів отвирає дуже широкі горизонти. Вона позволить мабуть близше пізнати взаїмні ділання молекулів, як се

¹⁾ Langevin. Rapports et discussions de la réunion tenue à Bruxelles du 30. octobre au 3. novembre 1911. Paris 1912. p. 392.

²⁾ Sommerfeld. Verhandl. d. deutsch. phys. Gesellsch. 1911. S. 1074.

доси можна було. Також для хемічних дослідів буде вона мати немалу вартість. Вкінці можемо додати, що вона відповідає теперішньому змаганю, розкладати енергію і всілякі ділання на елементи. Протів теорії магнетонів підніс заміти А. Heydweiller¹⁾, опираючи їх на сім, що основою Pascal-ових магнетних помірив була вартість χ води о 4% за велика і що після найновіших дослідів атомовий магнетизм металів в розчинах є функцією концентрації, а не є сталою величиною, як доси приймає. На перший заміт відповів R. Gans²⁾, заявляючи, що не ходить тут о абсолютні вартости χ , лише о релятивні. Що до другого, то треба виждати докладніших помірив.

7. Сучасний стан дослідів над магнетизмом і вигляди на будуче.

В сім короткім огляді сучасних дослідів над магнетизмом вепили ми зачіпати лише деякі сторони так різнородних явищ, якими є магнетні явища. І так доторкнули ми лише злегка інтересного і дуже зложеного явища гістерези і коерцитивної сили, обговорили лише коротко магнетні прикмети стопів, а поминули зовсім вплив тиснення і часу на магнетні прикмети тіл, як також звязь між магнетними явищами а зміною обему, еластичностию і иншими прикметами тіл. Однак вже ті явища, які обговорено, видають досить ясне світло на суть магнетизму. До прояснення сеї царини причинили ся головню досліди передпоследного і последного десятилітя, по перше тому, що останніми літами ведено їх досить систематично, а по друге техніка експериментованя пішла в последнім часі високо в гору; возьмім хочби на увагу те, що межі температури посунено дуже високо в гору і дуже низько в долину, а силі поля повело ся дати величину 50000 C. G. S.

В модерних теоріях магнетизму бачимо знов стремління пересунути причину магнетних примет тіл у нутро атома. Коли давнйше вважано молекули зглядно атоми последними звенами у ланцуху фізикальних, отже і магнетних явищ, так тепер відповідно до теорії електронів став атом сам для себе світлом, у якім відгрівають ся головні фізикальні явища; там також глядаємо жерел магнетних явищ. Сі нові теорії дають враз з експериментальними дослідями сильну основу для пізнання не лише самих магнетних явищ,

¹⁾ A. Heydweiller. Verh. d. Deutsch. phys. Ges. 13, 1063, 1911; 15, 1120, 1913.

²⁾ R. Gans, ibid. 14, 367, 1912.

але також і інших, котрі або тяжко дослідити і в'яснити другим способом, або навіть і неможливо. Для прикладу киньмо оком на праці Pascal-a. Вони вказують нам на те, як великі гороскопи подають маґнетохемічні досліди для пізнання внутрішньої будови молекулів тим більше, що маґнетні методи далеко вразливіші, як деякі другі. Langevin-ова теорія, що сполучила так ціпко парамаґнетні і діамаґнетні явища, які доси уважано майже зовсім відрубними, встигла звязати діамаґнетизм з явищем Zeeman-a, а також пояснити багато маґнетних прикмет тіл. А вже-ж вершком найновіших успіхів є Weiss-ові маґнетони, сї найдрібніші маґнетні елементи, із яких побудовані маґнетні атоми. Відкритє їх належить до найзамітнійших відкрить на полї фізики в останніх літах, і досліди над ними, хоч щойно почали ся, принесли вже багато інтересного матеріалу.

Однак не треба забувати, що ще далеко до докладного проясненя маґнетних явищ. Навіть теорії Langevin-a і Weiss-a, що, опираючи ся на нових експериментальних дослідах, представляють великий поступ в порівнянню із старими теоріями, не вільні від багатьох недостач. Справді багато фактів промавляє за ними, але є також факти, що не так легко дадуть ся підтягнути під схему сих теорій. Однак підвалини досить сильні, треба лише деяких модифікацій, щоби вигладити нерівности і довести до гармонії між теорією а експериментом. Се можна буде осягнути лише новими і докладними помірами, бо дотеперішні ще не вистарчають, а хоч доси назбирано багато матеріалу, однак до недавна годі було його визискати задля систематичних і експериментальних недостач. Розуміє ся, розвиток сеї доси почасти занедбаної царини фізики буде впливати також на досліди над другими царинми, а вже навіть тепер зауважуємо проблєски сего впливу, як се висше згадано. Але ще багато праці треба буде вложити, щоби виповнити недостачі і довести досліди над маґнетизмом до того стану розвитку, у яким находять ся другі області фізики.

Чернівці, грудень 1913.

