




N_A



9 вересня —

День народження


Олександра Смакули




15:00 – „Формула Смакули: український геній у Массачусетсі” (Василь Липовецький, Тернопільський обласний фонд імені професора Олександра Смакули).

15:30 – „Бачити, щоб перемогти: як винаходи Смакули допомагають захисникам” (Юрій Скоренький, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя).

16:00 – „Олександр Смакула – засновник квантової органічної хімії” (Ольга Спільніченко, Галицький коледж імені Вячеслава Чорновола).





У ЗОЛОТУ ОСІННЮ ПОРУ
В СЕЛІ
ДО БАТЬКІВСЬКОГО ДВОРІ
МРС ПОВЕРНЕТЬСЯ ІМЯ

ТУТ БУЛА ЖИТЯ
ОЛЕНА ІОАННА СМЯКЕНКО
1900 - 17.05.1983

Х. ЗВІТ

ДИРЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГІМНАЗІЇ

(ДАВНІЙШЕ ГІМНАЗІЇ ФРАНЦА ЙОСИФА)

В ТЕРНОПОЛІ

:: :: :: :: ЗА ШКІЛЬНИЙ РІК 1920/21. :: :: :: ::



ТЕРНОПІЛЬ.

З ДРУКАРНІ ЛЬВА ВЕРБІЦЬКОГО В ТЕРНОПОЛІ.

1921.



Tarnopol

C. K. Gymnasyum Ruski

I. Склад учительського Збору

з кінцем шк. р. 1920/21.

а) Етатові учителі чинні з кінцем шк. р. 1920/21:

1. **Левицький Юліян**, директор.
2. **Безкоровайний Василь**, професор, учив мат. в кл. IIIб., IV, V, VIIа., фіз. в кл. IIIб., IV, VIIа., опікун кл. VIIIб.; тижд. год. 19+6
3. **Брикович Лярій**, професор, учив лат. м. в кл. VI, VIIIб., гр. в кл. VIIIб., опікун кл. VIIIб.; тижд. год. 16+6
4. **Губчак Михайло**, професор, учив укр. м. в кл. Ia., лат. в кл. Ia., гр. в кл. V, VII, співу (надоб.) в 1 відд., опікун кл. Ia.; тижд. год. 22+6
5. **Зарицький Мирон**, професор, учив мат. в кл. VI, VII, VIIIб., фіз. в кл. VII, VIIIб., проп. ф. в кл. VII, VIIа., VIIIб., опікун кл. VII, канцелярійний помічник директора; тижд. год. 20+12
6. **О. Конрад Николай**, професор, гр. кат. катехит, учив рел. в кл. приг. Ib., II, IIIа., IIIб., IV, V, VI, VII, VIIа., VIIIб., виголошував 1 екс.; тижд. год. 24
7. **Срібний Теодор**, др. філь., проф. учив геогр. в кл. Ia., іст. і геогр. в кл. II, IIIб., V, VIIа., VIIIб., завідатель геогр. габінету; тижд. год. 23
8. **Старецький Бронислав**, професор, учив укр. м. в кл. VIIа., VIIIб., гр. в кл. VIIа., опікун кл. VIIа.; тижд. год. 13+6
9. **Цегельський Лев**, др. філь., проф., учив укр. м. в кл. IV, V, VI, VII, гр. в кл. IIIа., опікун кл. VI; тижд. год. 20+6
10. **Водяний Тома**, учитель, ісп., учив укр. м. в кл. IIIа., лат. в кл. IIIа., IIIб., V, опікун кл. IIIа.; тижд. год. 20+6
11. **Галушинський Іван**, учитель, ісп., учив мат. в кл. Ia., Ib., II, IIIа., фіз. в кл. IIIа., прир. в кл. Ia., Ib., II, V, VI, завідатель природописного габінету; тижд. год. 28+2
12. **Дорундяк Семен**, учитель, учив поль. м. в кл. II, IIIа., IIIб., IV, нім. в кл. IIIа., IV; тижд. год. 14
13. **Кузик Семен**, учитель, учив лат. м. в кл. II, VII, VIIа., гр. в кл. VI, опікун кл. II; тижд. год. 21+6

14. **Танчаковський Ярослав**, учитель, учив укр. м. в кл. Ib., лат. в кл. Ib., гр. в кл. IIIб., IV, опікун кл. Ib.; тижд. год. 19+6
15. **Филипович Олександр**, учитель, учив укр. м. в кл. IIIб., нім. в кл. II, IIIб., V, VI, VII, VIIа., VIIIб., опікун кл. IIIб.; тижд. год. 26+6
16. **Цебушник Дмитро**, учитель, ісп., учив укр. м. в кл. II, поль. в кл. Ia., Ib., V, VI, VII, VIIа. і VIIIб.; тижд. год. 20
17. **Шанковський Клим**, учитель, ісп., учив геогр. в кл. Ib., іст. і геогр. в кл. IIIа., IV, VI, VII; тижд. год. 20

б) Етатові учителі нечинні з кінцем шк. р. 1920/21:


1. **Редкевич Лев Орест**, професор, на відпустці для ведення управи прив. укр. гімназії в Долині.
2. **Горчинський Йосиф**, учитель, на відпустці для повнення обов'язків в прив. укр. гімназії в Чорткові.
3. **Юхнович Юліян**, на відпустці для поратования здоров'я.

в) Етатові учителі з інших шкіл, чинні з кінцем шк. р. 1920/21:


1. **Гурський Бронислав**, учитель реальної школи, учив рисунків в кл. Ia., Ib.; тижд. год. 6
2. **Щепанік Володислав**, учитель I. поль. гімн., учив рисунків (надобовязково) в 2 відд.; тижд. год. 4
3. **Залужний Володимир**, управитель нар. школи в Березовиці вел., учив укр. м., поль., рах., рис., кал. в приг. кл. і кал. в кл. Ia., Ib., опікун приг. кл.; тижд. год. 18+6

г) Контрактові учителі чинні з кінцем шкільного р. 1920/21:

- О. **Кочій Ле**, гр. кат. катехит видільової школи, учив рел. в кл. Ia., лат. в кл. IV, опікун кл. IV, виголошував 1 екс.; тижд. год. 12+6



<https://www.uni-goettingen.de/en/266241.html>



Carl Zeiss Jena





ZEISS C Sonnar T* 50mm f/1.5 ZM Lens



Leica M-Mount Lens
Aperture Range: f/1.5 to f/16
ZEISS T* Anti-Reflective Coating
Manual Focus Design

You Pay: **\$1,261.00**



[www.bhphotovideo.com/c/product/446177-EG/
Zeiss_1407_067_50mm_f_1_5_ZM_Lens.html](http://www.bhphotovideo.com/c/product/446177-EG/Zeiss_1407_067_50mm_f_1_5_ZM_Lens.html)



Contact

Events

International

ZEISS International

About ZEISS

Innovation and Technology

Responsibility

Careers

Newsroom

History

★ ZEISS Story

[Home](#) / [History](#) / [Company History](#) / [At a Glance](#) / [Milestones](#)

Innovations

Here you will find an overview of the most important innovations in the history of Carl Zeiss AG.

1857 – 1894 | 1895 – 1945 | 1946 – 1999 | 2000 –



1902

Tessar® lens, the "eagle eye of the camera".



1922

Length measuring machine based on Eppenstein's principle.



1935

Patent for the coating technique developed by Alexander Smakula to reduce reflections on glass



1912

The first ophthalmoscope and the



1935

Patent for the coating technique developed by Alexander Smakula to reduce reflections on glass

http://www.zeiss.de/

Contact | Events



We make it visible.

Search

ne

Productfinder

ublisher

Corporate Information

Home

News

Our Solutions

Products

Press Forum



quality of the company's binoculars. In 1935, the Zeiss employee Alexander Smakula (1900–1983) invented the antireflective T-star coating (Carl Zeiss T*®) used to reduce the reflections on glass-to-air surfaces. In this way, the transmission of the binoculars was increased by an astounding 50 %.

You can find the many other improvements and inventions which have made Carl Zeiss an innovative market leader for many decades under

→ [The History of Binoculars at Carl Zeiss.](#)

NONREFLECTING FILMS

1.17

In optical instruments like compound microscopes, of lenses are employed. When light enters the optical 4 % of the incident light is lost in single reflection. The gets transmitted. The loss is even more for multiple reflections. scope composed of four lenses, 30 % of the incident light is re intensity conditions, these losses are undesirable. Therefore, the light due to reflection from an optical surface. To achieve this re ate material having a proper thickness is deposited on the glass surface. This film is kn film, discovered by the German scientist Alexander Smakula.




Fig. 1.21 Antireflection coating

For $\mu_1 = 1$ (air medium), $\mu_2 = 1.5$ (glass medium),

$$\frac{I_R}{I} = \left(\frac{1.5 - 1}{1.5 + 1} \right)^2 = 4\%$$


Therefore, 4% of the light intensity is wasted in reflection and 96% of the intensity gets transmitted.

MgF_2 (magnesium fluoride) is an appropriate material for coating. Its refractive index is 1.38, which lies between the refractive index of air and glass. If λ is the wavelength of light used and μ is the refractive index

To understand this fact, let us consi agating in a medium (air) of refractive normally on a glass surface having r Fig. 1.21). If the intensity of the inci the reflected light is I_R then accordi that relates the two intensities, we hav

$$\frac{I_R}{I} = \left(\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} \right)^2$$

$$\frac{I_R}{I} = \left(\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} \right)^2 \quad (1.65)$$



Engineering Physics



Tata McGraw-Hill

Published by Tata McGraw Hill Education Private Limited,
7 West Patel Nagar, New Delhi 110 008

Engineering Physics, 1e

Copyright © 2010, by Tata McGraw Hill Education Private Limited

Фізика і техніка в Україні



Олександр Теодорович Смакула (1900–1983) — видатний український фізик і винахідник. Використавши поняття квантових осциляторів, О. Т. Смакула зміг пояснити радіаційне забарвлення кристалів і вивести кількісне математичне співвідношення, відоме як *формула Смакули*. Праці вченого стосуються синтезу вітамінів А, В2 та ін., а процес тривалого зберігання вуглецю називають тепер *інверсією Смакули*.

У 1935 р. О. Т. Смакула зробив відкриття, завдяки якому увійшло в історію науки, — спосіб поліпшення оптичних пристроїв. Суть відкриття в тому, що поверхню лінзи вкривають шаром товщиною $1/4$ довжини падаючої хвилі (десяті частки мікрометра). Це відкриття стало великим здобутком, адже лінзи є основою багатьох оптичних пристроїв (фотоапаратів, біноклів, мікроскопів тощо). У 2000 р. був оголошений ЮНЕСКО роком О. Т. Смакули.

<http://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/fizyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-za-red-bariakhtara-v-h-dovhoho-s-o.pdf>





У 1935 р. український учений Олександр Теодорович Смакула зробив відкриття — спосіб поліпшення оптичних приладів, що дістав назву *«просвітлення оптики»*. Суть відкриття полягає в тому, що поліровану поверхню скляної лінзи покривають тонким шаром певного матеріалу. Завдяки явищу інтерференції в цій тонкій плівці відбите від полірованої поверхні світло гаситься і більше світла проходить уперед. Таких поверхонь на шляху світла, що проходить через складний прилад, досить багато, тому втрата навіть кількох відсотків світла на відбиття на кожній з них привело б до того, що на виході ми вже нічого не побачили. Лінзи є основним елементом різних оптичних приладів: фотоапаратів, мікроскопів, телескопів, перископів, стереотруб, біноклів, оптичних пристроїв до стрілецької зброї тощо (мал. 163). Таким чином, це відкриття стало великим надбанням, яким користується все людство і сьогодні, як на Землі, так і в космосі для фотографування Землі та інших планет.

За допомогою інтерференції можна оцінити якість шліфування поверхні виробу з точністю до $1/10$ довжини хвилі, тобто з точністю до 10^{-6} см. Для цього на поверхню, яку перевіряють, накладають еталонну пластинку, освітлюють її монохроматичним світлом і спостерігають інтерференційну картину. Якщо якість полірування висока, то на поверхні видно паралельні інтерференційні смуги. Якщо на поверхні є нерівності, інтерференційні смуги викривлюються.

Існують спеціальні прилади — інтерферо-



Мал. 163. Об'єктиви з просвітленою оптикою

People

Viewing Record 38 of 39

[Previous Record](#) [Next Record](#)

Switch Views: [Lightbox](#) | [Image List](#) | [List](#)

Smakula, Alexander

Laboratory for Insulation Research: Associate Director 1951-1964;
Department of Electrical Engineering: Research Associate 1951-1959;
Associate Professor 1959-1962; Professor 1962-1966; Professor Emeritus
1966-1983.

MIT Museum Biographical file contents: Images; biographical information;
correspondence; news clippings; news releases; notes



Alexander Smakula, Ph.D.
Associate Professor of Crystal Physics

Technische Physik in Einzeldarstellungen

Herausgegeben von W. Meissner und M. N.

Einkristalle

Von

A. Smakula



Springer-Verlag / Berlin · Göttingen · H

J. F. Bergmann / München

1962

Kristallverwerfungen können werden. Die Berührungs eben und die Neigungswinkel. In Kristallen von großen Verwerfungen können leicht nachgewiesen werden (Abb. 1).

Die bisher genannten Kristalle würden auch dann auftreten



Abb. 1. M

aufgebaute unregelmäßige Kristalle. Chemische Einheiten nehmen meist nach der Kristallstruktur Wert

die Bindung ist, um so kleiner der Radius. Auffallend ist, daß der Unterschied zwischen der (S. 25 näher behandelten) metallischen und der kovalenten Bindung verhältnismäßig klein ist. Außerdem ändert sich der Atomradius mit der Zahl der nächsten Nachbarn in gleichem Abstand (Koordinationszahl K. Z.) und zwar nimmt er annähernd ab beim Übergang von³

K. Z. 12 zu K. Z. 8 um	3%
K. Z. 12 zu K. Z. 6 um	4%
K. Z. 12 zu K. Z. 4 um	12%

2.11 Atomradien der van der Waalsschen Bindung

Da die VAN DER WAALSSchen Kräfte sehr schwach sind (rund 1 bis 10% der elektrostatischen Kräfte), sind die Radien verhältnismäßig groß und außerdem stark von den Bindungspartnern abhängig. Die VAN DER WAALSSchen Radien treten in den Gittern der Edelgase und in Molekulkristallen (bei denen Moleküle als Kristallbausteine betrachtet werden

Tabelle 1. Atomradien für van der Waalssche Bindung in Angström. (Nach LAVES)

Atom-No.	Symbol	Radius	Temperatur °K
----------	--------	--------	------------------



, Skrifte
5.


iversity

³ SMAKULA, A. und M. W. KLEIN: J. Opt. Soc. Am. 40, 148 (1950).

A. Smakula. Einkristalle:
Wachstum, Herstellung und
Anwendung
Tom 14 3 cepii Technische
Physik in Einzeldarstellungen

Олександр
СМАКУЛА

МОНОКРИСТАЛИ



Олександр
СМАКУЛА

МОНОКРИСТАЛИ

виращування, виготовлення
та застосування

*Переклад з німецької
Надії МЕЛЬНИК і Павла ТРОЦЕНКА*


*За редакцією
Володимира КОЗИРСЬКОГО
і
Василя ШЕНДЕРОВСЬКОГО*

Київ
Видавництво «Рада»
2000

Олександр
СМАКУЛА

НАУКОВІ ПРАЦІ

Том I



Наукове товариство імені Шевченка
Громадське об'єднання "Фонд Олександра Смакули"
Тернопільський державний технічний університет
імені І. Пулюя

Олександр
СМАКУЛА

НАУКОВІ ПРАЦІ

Том I

Тернопіль
2000

ЗМІСТ

ОЛЕКСАНДЕР СМАКУЛА І ЙОГО НАУКОВА СПАДЩИНА	4
I. ФІЗИКА ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В КРИСТАЛАХ	9
До фосфоризації алькалевих гальоїдів	10
Центри забарвлення у кристалах фтористого кальцію та фтористого барію	15
Знебарвлення кристалів CaF_2 , забарвлених X-променями	17
Центри забарвлення в кристалах фториду кальцію	19
Забарвлення та центри забарвлення у кристалах фториду кальцію	20
Співвідношення для спектра поглинання центрів забарвлення в кубічних кристалах	26
Забарвлення чистих і легованих кристалів фториду кальцію при 20°C і -190°C	29
Центри забарвлення у фторидах лужно-земельних металів	38
Центри забарвлення в монокристалах галогенідів цезію	45
Вплив температури на центри забарвлення у фторидах лужно-земельних металів	55
Анізотропія центрів забарвлення у кальциті	59
Центри забарвлення в змішаних лужногалоїдних кристалах	64
II. ВПЛИВ ДЕФЕКТІВ ТА ДОМІШОК НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ І ТОНКИХ ПЛІВОК	73
Деякі спектри поглинання лужногалоїдних фосфорів зі сріблом та міддю як активаційними металами	74
Про вплив домішкових йонів на фотохімічні процеси у лужногалоїдних кристалах	82
Недосконалості монокристалів германію	85
Домішки кисню в монокристалах кремнію	86
Дефекти у змішаних кристалах $\text{KCl} - \text{KBr}$	92
Дефекти в йонних кристалах	96
Деякі фізичні властивості майже досконалого природного алмазу	103
III. ОПТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПРОСВІТЛЕННЯ ОПТИКИ	105
Спосіб підвищення пропускання світла оптичними елементами за рахунок зменшення відбивної здатності на межах розділу цих оптичних елементів	106
Про підвищення світлосили оптичних приладів	109
Про винайдення способу зменшення відбивання світла	112
Неоднорідність змішаних кристалів галоїдів талію та її усунення	117
Роздільна здатність призм, виготовлених з однорідних кристалів бромйодиду талію	123
Вплив структури на оптичні властивості кристалів	124
Синтетичні кристали і поляризаційні матеріали	125
Оптичні матеріали та їх виготовлення	137
Властивості NiO і CoO та їх змішаних кристалів в інфрачервоній ділянці спектру	144
Інтерпретація змінення твердого розчину за допомогою коливальних спектрів	150
IV. ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВІТАМІНІВ	156
Ультрафіолетове поглинання геометрично ізомерних стильбенів і корисцевих кислот (β -фенілакрилових кислот)	157
Поглинання ультрафіолетового випромінювання та ізомерія малеїнових і фумарових кислот	164
Фотохімічне перетворення транс-стильба	171
Про фізичні методи у хімічній лабораторії. Поглинання світла і хімічна будова речовини	177
Про визначення молекулярної ваги полістиролів	188
Зауваження до роботи О. Смакули: "про визначення молекулярної ваги полістиролів"	193

Світлопоглинання та подвійний зв'язок. I	194
Світлопоглинання та подвійний зв'язок. II	198
Світлопоглинання та подвійний зв'язок. III	202
Світлопоглинання та подвійний зв'язок. IV	206
V. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ І ТОНКИХ ПЛІВОК	210
Дослідження росту кристалів методом термічного травлення і орієнтованого нарощування	211
Вирощування та вдосконалення монокристалів	216
Вирощування кристалів хлориду цезію з розчину та розплаву	242
Хімічні та фізичні проблеми виготовлення матеріалів	246
Дефекти в кристалах, вирощених з оксидів перехідних металів	248
Автоепітаксiale зародження центрів кристалізації на поверхні йонних кристалів	255
Пластична деформація та кристалічна орієнтація галоїдів талію	258
Вплив обробки на структуру оптичної поверхні пластичних кристалів	267
Дослідження процесу ковзання в йонних кристалах методом призматичного натискування	270
Діелектричні властивості оксиду кобальту, оксиду нікелю та їхніх змішаних кристалів	278
Температурна залежність діелектричної сталої кристалів лужних і талієвих галоїдів	287
Діелектричні властивості лужно-земельних фтористих монокристалів	289
Діелектричні аномалії в монокристалах кремнію	296
Діелектричні властивості галоїдів талію і їхніх змішаних кристалів	299
Діелектричні властивості напівпровідників при низьких температурах	305
VI. ПРАЦІ З МЕТРОЛОГІЇ	314
Точне визначення сталих ґратки за допомогою дифрактометра X-променів з лічильником ґейгера	315
Точне визначення густини великих монокристалів гідростатичним зважуванням	324
Густина та недосконалості монокристалів	328
Нове визначення числа авогадро за сталою ґратки та густиною монокристалів	334
Високоточне визначення густини твердих тіл	339
Очевидність похибки в атомній вазі германію	345
Високоточне визначення густини природних алмазів	347
VII. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ	355
Дещо про атомістичну будову матерії	356
Помір високости взнесення літаків при помочі бездротного телеграфу	358
Відшукування металевих руд при помочі електро-магнетних хвиль	360
З технічної літератури	364
Нові досягнення при помочі коротких електричних хвиль	365
Помір питомого опору плинного воздуха	368
Земля і радіоактивність	373
Нові видосконалення динамомашин	375
Антирахітичний вітамін	380
Атлантийський перелет	382
Рурковий магнет	384
Електричні прояви при влученні	385
Листи до редакції — "нові видосконалення динамомашин"	386
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРА СМАКУЛИ	391
СПИСОК ПОВНИХ ТА СКОРОЧЕНИХ НАЗВ ВИДАНЬ, ДЕ ПУБЛІКУВАЛИСЬ ПРАЦІ О. СМАКУЛИ	401



Massachusetts Institute of Techn



Ук



Массачусетський т інститут

Massachusetts Institute of Techno

4,6 ★★★★★ (2 708)

Університет



Маршрути



Зберегти





Поблиз





Google




77 Massachusetts Ave, Ca



*Артилерія
змінюється,
закони фізики – ні.*




До чого тут *фізика*?




<https://www.wikihow.com/Shoot-a-Basketball>





















Попередження: на наступних слайдах будуть формули!

$$g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Кінематика !!!



$$\begin{cases} X = X_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ v_x = v_{0x} + a_x t \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

$$a_x = 0 \Rightarrow v_x = \text{const}$$

$$a_y = -g \Rightarrow v_y = v_{0y} - g t$$

$$\text{Якщо } X_0 = 0; y_0 = 0$$



$$\begin{cases} X = v_{0x}t \\ y = v_{0y}t - \frac{g t^2}{2} \end{cases} \quad \text{де } v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

Треба $x=L; y=H$

$$\begin{cases} L = v_0 \cdot t \cdot \cos \alpha \\ H = v_0 \cdot t \cdot \sin \alpha - \frac{g t^2}{2} \end{cases} \Rightarrow t = \frac{L}{v_0 \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow H = L \cdot \tan \alpha - \frac{g L^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{g L}{2 \left(\tan \alpha - \frac{H}{L} \right) \cos^2 \alpha}}$$



$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ v_x = v_{0x} + a_x t \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

$$a_x = 0 \Rightarrow v_x = \text{const}$$

$$a_y = -g \Rightarrow v_y = v_{0y} - g t$$

$$\text{Начало } x_0 = 0; y_0 = 0$$

$$\begin{cases} x = v_{0x}t \\ y = v_{0y}t - \frac{g t^2}{2} \end{cases} \quad \text{где } v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

$$\text{Тогда } x = L; y = H$$

тогда

$$\begin{cases} L = v_0 \cdot t \cdot \cos \alpha \\ H = v_0 \cdot t \cdot \sin \alpha - \frac{g t^2}{2} \end{cases} \Rightarrow t = \frac{L}{v_0 \cos \alpha}$$


$$H = L \tan \alpha - \frac{g L^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{g L}{2 \left(\tan \alpha - \frac{H}{L} \right) \cos^2 \alpha}}$$

Не враховано
опір повітря!

Не влучив!

: (



$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ v_x = v_{0x} + a_x t \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

$$v_y = 0 \Rightarrow v_x = \text{const}$$

$$a_y = -g \Rightarrow v_y = v_{0y} - g t$$

$$\text{Якщо } x_0 = 0; y_0 = 0$$


$$\begin{aligned} \begin{cases} x = v_{0x}t \\ y = v_{0y}t - \frac{g}{2}t^2 \end{cases} & \text{де } v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ & v_{0y} = v_0 \sin \alpha \\ \text{Треба } x=L; y=H & \text{тоді } \begin{cases} L = v_0 t \cos \alpha \\ H = v_0 t \sin \alpha - \frac{g}{2}t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{L}{v_0 \cos \alpha} \\ H = L \tan \alpha - \frac{g L^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} & \Rightarrow H = L \tan \alpha - \frac{g L^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \\ v_0 = \sqrt{\frac{g L}{2 (\tan \alpha - \frac{H}{L}) \cos^2 \alpha}} & \end{aligned}$$

Не все так
просто?!

Враховано
опір повітря!

Влучив!

:)



$$\begin{aligned} m \vec{g} + \vec{F}_{\text{оп}} &= m \vec{a} \\ \Downarrow \\ v_x: \int -k v_x &= m a_x \\ v_y: \int -mg - k v_y &= m a_y \end{aligned}$$

$$F_{\text{оп}} = k v$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}; a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt}; a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{k}{m} v_x = 0 \Rightarrow \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt \Rightarrow v_x = v_{x0} e^{-\frac{k}{m} t} \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{k}{m} v_y + g = 0 \end{cases} \dots \Rightarrow v = f(t) \dots$$

Насправді
ось так :

$$v_0 = f(L, H, d, k, m)$$

ПТРК Стугна



Переносний протитанковий ракетний комплекс

«СТУГНА-П»


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Дальність ураження цілі, м
100-5000	- в денний час
100-3000	- в нічний час
	Бойова частина:
не менше 800	- тандемна кумулятивна, бронепробиття за динамічним захистом, мм
не менше 60	- осколково-фугасна з ударним ядром: бронепробиття, мм
не менше 600	- кількість осколків, шт.
	Маса, кг:
30	- ракета в транспортно-пусковому контейнері
38,2	- пускова установка
14	- пульт дистанційного керування
15	- прилад наведення
4,1	- тепловізійна камера
	Габаритні розміри, мм:
130	- калібр ракети
1360	- довжина контейнера
140	- зовнішній діаметр контейнера



<https://armyinform.com.ua/2021/10/12/ptrk-stugna-p-vysokotochna-snajperska-gvyntivka/>

<https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-voyiny-z-ptrk-stugna-p-znyshhyly-vorozhu-bronetehniku-na-luganshhyini/>



FIM-92 Stinger



це його
“ОКО”




<http://www.military-today.com/missiles/stinger.htm>

Лазерна система розмінування "ZEUS"



RADBO (Recovery of Airbase Denied by Ordnance)



[https://en.wikipedia.org/wiki/ZEUS-HLONS_\(HMMWV_Laser_Ordnance_Neutralization_System\)](https://en.wikipedia.org/wiki/ZEUS-HLONS_(HMMWV_Laser_Ordnance_Neutralization_System))

<https://armyinform.com.ua/2020/10/03/>

“очі армії”

Може це бінокль?



перископ?



стереотруба?




А може лазерний далекомір?



Або лазерний
цілевказівник?



Чи
артилерійська
бусоль?





Щоб двічі не літати, корисно мати з собою трохи вибухівки (або **ракету**).

А також “очі”



Agricultural UAV modified to drop munitions,
Ukraine, July 2023. *Courtesy of Jack Watling*

А хто вгадає, скільки в перископі
лінз?

В цьому – вісім!

Версія ТР-8. Плакат на 1 листі

БЕСКОЛІНО

ПЕРИСКОП ТР-8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение	4x
Поле зрения	11 (1-83)
Диаметр выходного зрочка	4 мм
Удаление выходного зрочка	21,5 мм
Перископичность	403 мм
Вес перископа	1,055 кг
Вес перископа в упаковке	1,180 кг

Оптическая схема

1. Зеркало.
2. Пушинка.
3. Моноус.
4. Прокладка.
5. Линза оборачивающая вторая (силикатная).
6. Винт.

7. Линза оборачивающая первая (бромидная).
8, 9, 10. Стопорные винты.
11. Нондус-сетка.
12. Труба.
13. Обувка.
14. Головка.

15. Моноус зрительный.
16. Стекло защитное.
17. Зеркало.
18. Прокладка металлическая.
19. Прокладка прессованная.
20. Крышка.
21. Пушинка.


22. Моноус.
23. Моноус.
24. Винт.
25. Опора нондус-сетки.
26. Опора.
27. Опора.
28. Патрон локаторной оптики.

Угловая сетка

А хто винайшов просвітлення
оптики для покращення якості
лінз?



N_A



9 вересня —

День народження

Олександра Смакули

I. The Bakerian Lecture.— On the manufacture of glass for optical purposes

Michael Faraday

Published: 01 January 1830 | <https://doi.org/10.1098/rstl.1830.0002>

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS.

I. THE BAKERIAN LECTURE.—*On the manufacture of Glass for optical purposes.*



By MICHAEL FARADAY, *Esq. F.R.S. &c.*

Read November 19, December 3 and 10, 1829.


Introduction.

PERFECT as is the manufacture of glass for all ordinary purposes, and extensive the scale upon which its production is carried on, yet there is scarcely any artificial substance in which it is so difficult to unite what is required to satisfy the wants of science. Its general transparency, hardness, unchangeable nature, and varied refractive and dispersive powers, render glass a most important agent in the hands of the philosopher engaged in investigating the nature and properties of light; but when he desires to apply it, according to the laws he has discovered, in the construction of perfect instruments, and especially of the achromatic telescope, it is found liable to certain imperfections, not essentially existing, but almost always involved during its preparation, and fatal to its use. These are so important and so difficult to avoid, that science is frequently stopped in her progress by them; a fact fully proved by the circumstance that Mr. DOLLOND, one of our first opticians, has not been able to obtain a disc of


The Adjustment and Testing of Telescope Objectives Author: H. Dennis Taylor, 1891





Інтерференція в тонких плівках




Противідбивні покриття (просвітлююча оптика)










$$n = 1,52$$

1 – поверхня без покриття;


2 – покриття з $n = 1,40$;


3 - $n = 1,23$;

4 – тришарове покриття.



Фотолітографія






<http://www.addisonengineering.com/about-wafers.html>

Коефіцієнт відбивання

$$R = \left(\frac{n_0 - n_s}{n_0 + n_s} \right)^2$$

J.S. Rayleigh Proc. London Math. Soc.,
11 (1879) pp. 51-56

фторполімери



silsesquioxane resin

крон $n_0=1,52$

MgF_2 $n_s=1,38$



polyvinylfluoride



polyvinylidene fluoride





polytetrafluoroethylene




Anti-Reflection MgF₂ Coating Properties

Substrate: BK7



MgF₂ [400-700nm] Anti-Reflection Coating Performance
 Typical Energy Density Limit: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns
FOR REFERENCE ONLY

www.edmundoptics.com/resources/application-notes/optics/anti-reflection-coatings/




а може ...

Прилади нічного бачення



Прилади нічного бачення підсилюють слабе світло (фотопомножувачі)






* фотон - квант енергії світлової хвилі

$$\epsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$




Чим фотонів більше, тим ти живіший



<https://www.explainthatstuff.com/hownightvisionworks.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Scotopic_vision

А тепловізори – це щось зовсім інше



вони “бачать” інфрачервоне випромінювання






Тепловізійна камера
(або приціл, залежно від планів на вечір)

Оптична
система


Інфрачервоний
детектор

Обробка
сигналу

Відображення
на дисплеї



<https://www.atncorp.com/howthermalimagingworks>



IR 155

Magnesium fluoride

From Wikipedia, the free encyclopedia

Magnesium fluoride is an [inorganic compound](#) with the [formula](#) MgF_2 . The compound is a white crystalline [salt](#) and is transparent over a wide range of [wavelengths](#), with commercial uses in [optics](#) that are also used in [space telescopes](#). It occurs naturally as the rare mineral [sellaite](#).


Contents [\[hide\]](#)

- [Production and structure](#)
- [Uses](#)
 - [2.1 Optics](#)
- [Safety](#)
- [References](#)
- [External links](#)

Production and structure [\[edit\]](#)

Magnesium fluoride is prepared from [magnesium oxide](#) with sources of hydrogen fluoride such as [ammonium bifluoride](#):

Magnesium fluoride^[1]



Names

Other names

[Sellaite](#)


[Irtran-1](#)

Identifiers

CAS Number	7783-40-6 [i] [v]
3D model (JSmol)	Interactive image [i]
ChemSpider	22952 [i] [v]


KRS-5 Thallium Bromide-Iodide

thallium(I) iodide



(TlBr-TlI)

thallium(I) bromide



www.webelements.com/compounds/thallium

www.knightoptical.co

Oscillator strengths of defects in insulators : The generalization of Smakula's equation (*)

D. Y. Smith

Argonne National Laboratory, Argonne, Ill., U.S.A. and Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany

and G. Graham

Argonne National Laboratory, Argonne, Ill., U.S.A. and Franklin and Marshall College, Lancaster, Pa., U.S.A.

1. Introduction. — Smakula's [1] celebrated relation for the strength of a defect's optical absorption has formed the basis of quantitative absorption studies for fifty years. In the commonly used Mollwo-Roos [2] form, Smakula's equation states that for defects with oscillator strength f and density ρ in a host medium of refractive index n_0

$$\rho f = \frac{9}{4\pi} \frac{mc}{e^2 \hbar} \frac{n_0}{(n_0^2 + 2)^2} \mu_{\max} \Gamma, \quad (1)$$

where $\mu_{\max}$ and Γ are the maximum absorption coefficient and the full width at half maximum of the defect's absorption band, respectively.

This relation was originally deduced for a dilute solution of absorbing species in a transparent medium with constant refractive index on the assumption that the absorption is Lorentzian and that the field at the absorbing centre is the Lorentz local field.

l'absorption des défauts dans des matériaux ayant une variant rapidement. A titre d'exemple cette généralisation s. On trouve que dans KI coloré additivement, le rapport désaccord qualitatif avec le traitement théorique commun. 2. On discute les raisons possibles de ce désaccord.

- [1] SMAKULA, A., *Z. Phys.* **59** (1930) 603.
- [2] MOLLWO, E. and ROOS, W., *Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math.-Phys. Kl.* N.F. 1 No. 8 (1934) 107.
- [3] DEXTER, D. L., *Theory of the Optical Properties of Imperfections in Non-metals* in : *Solid State Phys.* Vol. **6**, eds. F. Seitz and D. Turnbull (Academic Press Inc., New York) 1958.
- [4] SMITH, D. Y. and DEXTER, D. L., *Optical Absorption Strengths of Defects in Insulators* in : *Progr. Opt.*, Vol. **10**, ed. E. Wolf (North-Holland, Amsterdam) 1972.
- [5] SMITH, D. Y. and SHILES, E., *Phys. Rev. B* **17** (1978) 4689.
- [5a] DEXTER, D. L., *Nuovo Cimento* **48B** (1967) 409, 415.
- [6] ALTARELLI, M., DEXTER, D. L., NUSSENZVEIG, M. and SMITH, D. Y., *Phys. Rev. B* **6** (1972) 4502.

- ~~uk.wikipedia.org/wiki/Число_Авогадро~~

~~$$N_A = 6.022\,140\,857(4) \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$~~

$$6.022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$



Amedeo Avogadro (1776–1856)



Densities and Imperfections of Single Crystals

September 1955 · Physical Review 99(6):1747-1750

DOI: 10.1103/PhysRev.99.1747

A. Smakula · J. Kalnajs · V. Sils

- $6.02368 \times 10^{23} \text{ mole}^{-1}$

A new determination of Avogadro's number from lattice constant and density of single crystals

February 1957 · Il Nuovo Cimento 6(S1):214-220


DOI: 10.1007/BF02724776

A. Smakula · J. Kalnajs


- <https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-silicon-spheres-and-international-avogadro-project>



Old SI




New SI



- The SI system before the redefinition: Dependence of base unit definitions on other base units (for example, the metre is defined in terms of the distance travelled by light in a specific fraction of a second), with the constants of nature and artefacts used to define them (such as the mass of the IPK for the kilogram).

- The SI system after the redefinition: Dependence of base unit definitions on physical constants with fixed numerical values and on other base units that are derived from the same set of constants.



Адреса підприємства, індекс
